



apteka
w sieci

Acetylcysteinum Flegamina 600 mg tabletki musujące 10 szt.

Cena: 9,82 zł



Opis słownikowy

Dawka	600 mg
Opakowanie	10 szt.
Postać	tabletki musujące
Producent	TEVA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Acetylcysteinum

Opis produktu

Postać

Tabletki musujące

Opakowanie

10 szt.

Działanie

Acetylcysteinum Flegamina zawiera substancję czynną acetylocysteinę, będącą lekiem rozrzedzającym uporczywy śluz w drogach oddechowych.

Wskazania

Lek wskazany jest dla młodzieży od 14. roku życia i dorosłych w celu rozrzedzenia śluzu i ułatwienia jego odkrztuszenia w zapaleniu oskrzeli wywołanych przeziębieniem z towarzyszącą uporczywą wydzieliną dróg oddechowych i zmniejszonym transportem śluzu.

Sposób użycia

Zalecane dawkowanie

Młodzież w wieku od 14 lat i dorośli - 1 tabletki musująca raz na dobę.



Sposób i czas stosowania

Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody, a następnie wypić zawartość całej szklanki. Lek można przyjmować niezależnie od posiłku. Nie stosować dłużej niż 5 dni.

Ostrzeżenia

Leku **Acetylcysteinum Flegamina** nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Z powodu znacznej zawartości substancji czynnej, leku **Acetylcysteinum Flegamina** nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Skład

Substancją czynną leku jest: acetylocysteina. 1 tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny. Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy, sodu wodorowęglan, kwas adypinowy, powidon K-25, aspartam (E 951), aromat cytrynowy (zawiera maltodekstrynę, sacharozę, gumę arabską (E 414)), triacetynę (E 1518), alfa-tokoferol (E 307)).