



Abrea 75mg x 90 tabletek

Cena: 6,95 zł



Opis słownikowy

Producent	KRKA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki

Opakowanie

90 tabletek

Skład

Substancja czynna

Kwas acetylosalicylowy


Pozostałe składniki

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia ziemniaczana

Skład pierwszej otoczki: talk, triacetyna, kwadu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, sodu dodecylosulfonian* i polisobat*

Skład drugiej otoczki: alkohol poliwinylowy (E1203), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, karmin (E120), żółcień pomarańczowa (E110), lak aluminiowy

Może zawierać sodu dodecylosiarczan i polisobat 80



Działanie

Lek **Abrea** zawiera kwas acetylosalicylowy, który w niewielkich dawkach należy do grupy leków zwanych lekami przeciwplatek. Kwas acetylosalicylowy wykorzystywany jest w leczeniu dla jego zdolności hamowania cyklooksygenazy w płytkach krwi, w których jest ona odpowiedzialna za produkcję tromboksanu. Przeciwdziała w ten sposób agregacji płytek krwi i tworzenia się zakrzepów.

Dzięki temu lek **Abrea** stosowany może być zapobiegawczo, w celu przeciwdziałania zawałom serca, udarom mózgu i chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których występuje stabilna lub niestabilna dławica piersiowa.

Wskazania

Zapobiegawczo: zawał serca, udar mózgu, choroby naczyniowe (u pacjentów, u których występuje stabilna lub niestabilna dławica piersiowa, po zabiegach chirurgicznych serca w celu rozszerzenia lub odblokowania naczyń krwionośnych, zapobieganie tworzenia się zakrzepów krwi

Sposób użycia

Osoby dorosłe:

- **Zapobieganie zawałowi serca:** Zalecana dawka wynosi 75-160 mg na dobę
- **Zapobieganie udarowi:** Zalecana dawka wynosi 75-325 mg na dobę
- **Zapobieganie zaburzeniom sercowo-naczyniowym:** Zalecana dawka wynosi 75-160mg na dobę

Tabletki połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu (1/2 szklanki). Tabletki nie należy kruszyć, rozłamywać ani żuć.

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników, nie stosować jeśli występował kiedykolwiek u pacjentów wrzód żołądka lub dwunastnicy, lub jakiegokolwiek rodzaj krwawienia (np. udar), nie stosować jeśli u pacjenta występowało kiedykolwiek zaburzenie krzepnięcia krwi, nie stosować przy ciężkich zaburzeniach czynności wątroby lub nerek, ciężkiego zaburzenia czynności serca (powodującego duszności, obrzęk kostek).

Kobiety w ciąży, karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem co do stosowania leku. W trakcie trzeciego trymestru ciąży nie stosować dawki większej niż 100mg na dobę.

Nie stosować leku u dzieci poniżej 16. roku życia.

W celu zapoznania się z dokładną informacją co do przeciwwskazań i postępowania z lekiem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.