



# Acatar Care Kids 0,25 mg/mL aerozol do nosa 15ml

Cena: 21,84 zł



## Opis słownikowy

Producent	US PHARMACIA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Aerozol

### Opakowanie

Pojemnik 15ml

### Działanie

Lek **Acatar Care Kids** zawiera substancję czynną oksymetazolini chlorowodoru, który zwęża naczynia krwionośne. Preparat redukuje obrzęk zmienionej zapalnie błony śluzowej i niweluje nadmierne wydzielanie, dzięki czemu umożliwia swobodne oddychanie przez nos.

Lek **Acatar Care Kids** redukuje przekrwienie błony śluzowej nosa, co powoduje otwarcie i rozszerzenie przewodów odprowadzających zatok przynosowych i odblokowuje trąbki słuchowe. To działanie ułatwia usuwanie wydzieliny i wyleczenie zakażenia bakteryjnego.

### Wskazania

Lek **Acatar Care Kids** wskazany jest w przypadku:

- obrzęku błon śluzowych występującym w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa,



- zapaleniu zatok przynosowych,
- zapaleniu trąbki słuchowej
- zapaleniu ucha środkowego.

#### Sposób użycia

- **Dzieci w wieku powyżej 1. roku życia do 6 lat** - 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę. Leku nie należy stosować dłużej niż 5 do 7 dni.

**Nie należy rozpylać aerozolu bezpośrednio na przegrodę nosową, gdyż może to powodować uszkodzenie błony śluzowej nosa.**

#### Ostrzeżenia

Leku **Acatar Care Kids** nie należy stosować:

- jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów),
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na oksymetazolinę chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos, no. usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej (operacja mózgu wykonywana przez nos lub usta).

Lek **Acatar Care Kids** może być stosowany ze szczególną ostrożnością i jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści i ryzyka w przypadku:

- leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) i innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi,
- zwiększonego ciśnienia śródgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesącznika,
- ciężkich chorób serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze),
- guza chromochłonnego nadnerczy,
- zaburzeń metabolicznych (np. nadczynności tarczycy, cukrzyca).

#### Skład

Substancją czynną leku jest oksymetazolinę chlorowodorek. 1 mL roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazolinę chlorowodoru. Pozostałe składniki to: glicerol 85%, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sodu hialuronian, kwas solny 25% (do ustalenia pH), sodu chlorowodorek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

1 dawka aerozolu o objętości 45 mikrolitrów zawiera 11,25 mikrogram oksymetazolinę chlorowodoru.