



acidolit saszetki, smak jabłkowy x 10 szt.



Cena: 28,22 zł

Opis słownikowy

Producent	POLPHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Proszek

Opakowanie

20 szt.

Skład

Glukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat naturalny

Sód	60	6 360 mg
Chlorki	50	8 180 mg
Glukoza	85	70 450 mg
Potas	20	3 640 mg
Cytrynian	10	8 640 mg
Osmolarność [mOsm/l]	225	-

Wartość energetyczna (energia)
Węglowodany

1328 kJ (312 kcal)
71 g



- w tym cukry (glukoza)

- skrobia
Sól

apteka
w sieci

Apteka " Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

71 g

0,9 g

15,9 g

Działanie

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w stanach zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych w organizmie

Acidolit, saszetki stosuje się w celu uzupełniania płynów oraz składników mineralnych w organizmie zarówno podczas biegunki jak i biegunki połączonej z wymiotami. Chroni organizm przed nadmierną utratą wody i cennych składników mineralnych.

Wskazania

Acidolit może być stosowany u niemowląt, dzieci, a także osób dorosłych. Zaleca się aby niemowlętom poniżej 6 miesiąca życia oraz dzieciom skłonny do alergii podawać Acidolit w wersji bezsmakowej.

Sposób użycia

- Do 200 ml przegotowanej, chłodnej wody dodać zawartość 1 saszetki i wymieszać.
- Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce ze smoczkiem.
- Roztworu nie należy dosładzać.
- Jeżeli występują wymioty płyn podawać schłodzony, małymi porcjami w niewielkich odstępach czasu (np. co 5 minut).

Do 4 kg

4 – 8 kg

8 – 12 kg

Powyżej 12 kg

50 ml po każdym biegun

50 ml – 100 ml po każdym bi

100 ml – 150 ml po każdym b

100 ml – 200 ml po każdym b

Nie należy spożywać więcej niż 6 saszetek w ciągu doby.

Ostrzeżenia

Produkt jest żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego. Należy go przyjmować pod nadzorem lekarza. Produkt jest przeznaczony dla niemowląt, dzieci, a także dorosłych. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.