



apteka
w sieci

ACTISEPT Spray antybakteryjny na skórę i błony śluzowe 50ml



Cena: 14,88 zł

Opis słownikowy

Producent	HASCO LEK
Rejestracja	Kosmetyk

Opis produktu

Postać

Płyn w sprayu

Opakowanie

Pojemnik ze spryskiwaczem 50ml

Skład

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Phenoxyethanol, Sodium Gluconate, Glycerin, Octenidine HCL, Sodium Hydroxide

Działanie

Actisept to gotowy do użycia preparat kosmetyczny zawierający oktenidynę oraz fenoksytanol. Przeznaczony jest do stosowania na skórę. Minimalizuje podrażnienia wspomagając jednocześnie regenerację błony śluzowej i skóry po drobnych urazach i uszkodzeniach: stłuczeniach, siniakach, w tym również miejscach potencjalnie narażonych na działanie drobnoustrojów takich jak: otarcia skóry.

Actisept przyczynia się do zahamowania rozwoju bakterii i jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę. Preparat nie powoduje podrażnień, delikatnie oczyszcza i usuwa zabrudzenia pomagając utrzymać higieniczną czystość.

Właściwości:



- hamuje rozwój bakterii
- chroni, oczyszcza i pielęgnuje skórę
- wspiera naturalny proces regeneracji podrażnionej skóry i błon śluzowych
- nie powoduje podrażnień
- delikatny, nie piecze, nie szczypie
- hipoalergiczny, bezzapachowy, bezzapachowy

Wskazania

Preparat wskazany jest do stosowania:

- na podrażnienia skóry
- w przypadku zwiększonego ryzyka niewłaściwej higieny, do pielęgnacji pępka u noworodka od pierwszych dni życia
- w przypadku występowania potówek u dzieci
- do pielęgnacji skóry ze skłonnością do trądziku i opryszczki
- do pielęgnacji skóry po goleniu/depilacji
- do pielęgnacji skóry po drobnych zabiegach kosmetycznych
- do pielęgnacji skóry po ukąszeniach owadów

Sposób użycia

Actisept stosuje się spryskując bezpośrednio powierzchnię skóry. Nie należy preparatu splukiwać. Stosować w zależności od potrzeb spryskując miejsca wymagające ochrony antybakteryjnej.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25 C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u wcześniaków z niską masą urodzeniową (poniżej 1500 g)