



Afrin ND 0,05% (0,5mg/ml), aerozol do nosa 15ml

Cena: 21,07 zł



Opis słownikowy

Producent	SCHERING
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać:

Roztwór

Dawka:

0,5 mg/ml

Opakowanie:

Aerozol 15 ml

Skład:

Oksymetazoliny chlorowodorek 0,5 mg oraz substancje pomocnicze: disodu edetynian, disodu fosforan bezwodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, powidon K29-32, benzalkoniowy chlorek, makrogol 1450, woda oczyszczona, alkohol benzylowy, celuloza mikrokryształiczna, karmeloza sodowa, aromat cytrynowy

Działanie:

Lek pomaga w utrzymaniu drożności nosa, odtyka zatkany nos, ułatwia oddychanie. Stosuje się co 12 godzin. Substancją czynną leku jest chlorowodorek oksymetazoliny.

Wskazania:



Leczenie objawów zatkanego nosa spowodowanych przeziębieniem, katarem siennym, zapaleniem zatok.

Przeciwwskazania:

Uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodrek oksymetazoliny. Jeśli pacjent jest leczony inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO, lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona oraz depresji). Inhibitory monoaminooksydazy mogą nasilać wzrost ciśnienia krwi wywołany przez oksymetazolinę. Jeśli pacjent choruje na jaskrę z wąskim kątem przesączania. U pacjenta po przezklinowym usunięciu przysadki. Jeśli pacjent choruje na zapalenie skóry i śluzówki przedsionka nosa z tworzeniem się strupów (suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa). Jeśli pacjent choruje na ostrą chorobę wieńcową i lewokomorową niewydolność serca („astmę sercową”). U dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia:

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, cukrzyca, trudności w oddawaniu moczu spowodowane rozrostem gruczołu krokowego (prostaty). Afrin ND stosowany przez dłuższy okres może powodować uczucie zatkanego nosa. Nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni. Jeśli po 7 dniach objawy nasilą się lub nie wystąpi poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób użycia:

Dorośli i dzieci w wieku 10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego, co 12 godzin. Dzieci w wieku 6-10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, co 12 godzin. U dorosłych nie należy stosować więcej niż 8 dawek aerozolu (u dzieci nie więcej niż 4 dawki) w ciągu 24 godzin. Przed pierwszym użyciem należy przygotować rozpylacz do stosowania, naciskając pompkę kilka razy, aż do pojawienia się pierwszego pełnego rozpylenia. Trzymając dozownik w pozycji pionowej, należy włożyć jego koniec kolejno do każdego otworu nosowego, nacisnąć pojemnik mocno raz lub dwa razy, wykonując jednocześnie wdech nosem.