



# ALLERTEC WZF 10 mg tabletki powlekane 10 szt.

Cena: 7,51 zł



## Opis słownikowy

Dawka	10 mg
Opakowanie	10 szt.
Postać	tabletki powlekane
Producent	POLFA WARSZAWA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Cetirizini dihydrochloridum

## Opis produktu

### Postać

Tabletki powlekane

### Dawka

10 mg

### Opakowanie

10 tabletek

### Działanie

ALLERTEC WZF to lek przeciwalergiczny zawierający cetyryzynę. Preparat przeciwhistaminowy, który dzięki zawartości dichlorowodorku cetyryzyny wykazuje właściwości łagodzące objawy reakcji zapalnej w przypadku pokrzywki, nieżyty nosa i zapalenia spojówek o charakterze uczuleniowym.

### Wskazania

W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. W sezonowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. W alergicznym zapaleniu spojówek. W przewlekłej idiopatycznej pokrzywce.



## Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Allertec WZF w przypadku: · nadwrażliwości na składniki leku, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny, · krańcowej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min).

## Ostrzeżenia

Przed planowanym wykonaniem testów alergicznych, lek należy odstawić na 3 dni. Podczas stosowania leku należy unikać przyjmowania alkoholu ze względu na możliwość sumowania się działania na ośrodkowy układ nerwowy. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, np. leków uspokajających. Lek zawiera laktozę; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

## Dawkowanie

Allertec WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacją podaną w tej ulotce. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabletkę powlekana) raz na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 mg (1 tabletkę powlekana) raz na dobę lub 5 mg (pół tabletki powlekanej) dwa razy na dobę. Dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg: 5 mg (pół tabletki powlekanej) na dobę. Dzieci w wieku poniżej 6 lat: U dzieci w wieku poniżej 6 lat zaleca się stosowanie cetyryzyny w postaci kropli lub syropu. Lek można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku. Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.

## Skład

Substancją czynną leku jest cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletkę zawiera 10mg cetyryzyny dichlorowodorku.

Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, hypromeloza, makrogol 6000.