



apteka
w sieci

Alugastrin tabletki do rozgryzania i żucia 40 szt.

Cena: 20,34 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Dawka | 340 mg |
| Opakowanie | 40 szt. |
| Postać | tabletki do rozgryzania i żucia |
| Producent | URGO SP.Z O.O. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |
| Substancja czynna | Dihydroxyaluminii natrii carbonas |

Opis produktu

Postać

Tabletki do rozgryzania i żucia

Opakowanie

40 szt.

Działanie

Alugastrin to lek łagodzący dolegliwości bólowe wynikające z nadkwaśnością soku żołądkowe. Działa on osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy. **Alugastrin** nie powoduje nadmiernej alkalizacji soku żołądkowego i wtórnego pobudzenia wydzielania kwasu solnego.

Wskazania

Lek **Alugastrin** stosuje się objawowo:

- w nadkwaśności soku żołądkowego;
- w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, często stosowane na przeziębienie);
- w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.



- Sposób użycia**
- **Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat** - rozgryźć lub żuć 1 lub 2 tabletki w godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości.

Jeśli po upływie 14 dni u dorosłych lub po upływie 7 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia

Leku **Alugastrin** nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na węglan dihydroksyglinowo-sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

Skład

Substancją czynną leku jest dihydroksyglinowo-sodowy węglan. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: mannitol, skrobia ziemniaczana, karmeloza sodowa, magnezu stearynian, substancja poprawiająca smak i zapach miętowa, sacharyna sodowa.