



Aspirin PRO 500 mg tabletki powlekane 8 szt.

Cena: 10,19 zł



Opis słownikowy

Producent	BAYER
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki powlekane

Opakowanie

1 op. 8 tabletek

Skład

1 tabletkę zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna, sodu węglan bezwodny. Otoczkę: wosk Carnauba, hypromeloza, cynku stearynian.


Działanie

Nowa Aspirin@PRO w porównaniu do zwykłych tabletek Aspirin działa 2 krotnie szybciej na ból. Opatentowana nowa technologia MicroActive® zapewnia szybsze uwalnianie i działanie leku. Zawiera zmikronizowane kryształki kwasu acetylosalicylowego oraz zbuforowany, musujący rdzeń. Całość zamknięta w tabletkę powlekaną nie podrażniając żołądka.

Wskazania

Do stosowania w bólach: głowy, zębów i mięśni, a także w przypadku dolegliwości towarzyszących przeziębieniu i grypie, gorączka, dreszcze, katar, kaszel.

Sposób użycia



Dorośli i młodzież (w wieku 16 lat i powyżej): jednorazowo 1 do 2 tabletek. W razie konieczności, dawka jednorazowa może być powtarzana po upływie co najmniej 4 godzin (nie więcej niż 6 tabletek na dobę).

Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i powyżej): jednorazowo 1 tabletkę. Dawka jednorazowa może być powtarzana po upływie co najmniej 4 godzin (nie więcej niż 4 tabletki na dobę).

Młodzież w wieku 12 – 15 lat (40 - 50 kg): jednorazowo 1 tabletkę. Dawka jednorazowa może być powtarzana po upływie co najmniej 4 godzin (nie więcej niż 6 tabletek na dobę). Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki lub dłużej niż 3-4 dni w leczeniu bólu, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Uwaga

Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z nieprawidłową czynnością wątroby lub nerek oraz w przypadku problemów z krążeniem. Tabletki należy przyjmować doustnie, z dużą ilością płynu. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, napady astmy oskrzelowej lub reakcje nadwrażliwości w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, skaza krwotoczna, ciężka niewydolność nerek, ciężka niewydolność wątroby.