



apteka  
w sieci

## AuroGastro tabletki powlekane 10 szt.

Cena: 9,18 zł



### Opis słownikowy

Dawka	10 mg
Opakowanie	10 szt.
Postać	tabletki powlekane
Producent	AUROVITAS PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Hyoscini butylbromidum

### Opis produktu

#### Postać

Tabletki powlekane

#### Opakowanie

10 szt.

#### Działanie

**AuroGastro** to lek zawierający substancję czynną **hioscyny butylobromek**, należącą do grupy leków zwanych "przeciwskurczowych".

#### Wskazania

Łagodzenie skurczów mięśni żołądka i jelit.

#### Sposób użycia

Zazwyczaj stosowana dawka leku **AuroGastro dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat**: 1 do 2 tabletek (10 mg do 20 mg), 3 do 5 razy na dobę.

Tabletki należy połykać w całości (bez rozgryzania i łamania), popijając płynem. Działanie obserwowano 15 minut po zażyciu. Leku **AuroGastro** nie należy podawać codziennie, w sposób ciągły przez długi czas bez badania przyczyn bólu brzucha.

Zwykle stosowana dawka dla dzieci w wieku 6-12 lat wynosi: 1 tabletką 3 razy na dobę.



Nie zaleca się stosowania leku **AuroGastro** u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

#### Ostrzeżenia

Kiedy nie stosować leku **AuroGastro**:

- jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na hioscyny butylobromek lub na którykolwiek z pozostałych składników leku,
- jeśli u pacjenta występuje rozrost gruczołu krokowego,
- jeśli u pacjenta występuje zatrzymanie moczu jakichkolwiek zaburzeń dotyczących cewki moczowej i gruczołu krokowego,
- jeśli u pacjenta występuje przeszkoda mechaniczna przewodu pokarmowego (zwężenie przewodu pokarmowego) lub zwężenie odźwiernika,
- jeśli u pacjenta występuje porażenna lub obturacyjna niedrożność jelit (porażenie jelit),
- jeśli u pacjenta występuje tachykardia,
- jeśli u pacjenta występuje jaskra (problem dotyczący oczu),
- jeśli u pacjenta występuje choroba zwana „myasthenia gravis” (bardzo rzadki problem z osłabieniem mięśni),
- u pacjentów z rozdęciem okrężnicy (megacolon, znaczne poszerzenie fragmentu jelita grubego),
- jeśli u pacjenta występuje rzadka choroba dziedziczna, która może uniemożliwiać przyjmowanie którejkolwiek zawartej w nim substancji pomocniczej.

#### Skład

Substancja czynna to butyloskopalamina/hioscyny butylobromek. Każda tabletkowa powlekana zawiera 10 mg butyloskopalaminy (bromku butylohioscyny).

Inne składniki leku to: Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan, skrobia kukurydziana, kwas winowy, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy. Otoczka: sacharoza, talk (E 553b), hypromeloza 2910 (5mPas) (E 464), makrogol 4000 (E 1521), glicerolu monostearnian (E 471), triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, polisorbata 80 (E 433).