



apteka
w sieci

AuroGastro tabletki powlekane 30 szt.

Cena: 13,20 zł



Opis słownikowy

Dawka	10 mg
Opakowanie	30 szt.
Postać	tabletki powlekane
Producent	AUROVITAS PHARMA
Substancja czynna	Scopolamini butylbromidum

Opis produktu

Postać

Tabletki powlekane

Opakowanie

30 szt.

Działanie

AuroGastro to lek zawierający substancję czynną **hioscyny butylobromek**, należącą do grupy leków zwanych "przeciwskurczowych".

Wskazania

Łagodzenie skurczów mięśni żołądka i jelit.

Sposób użycia

Zazwyczaj stosowana dawka leku **AuroGastro dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat**: 1 do 2 tabletek (10 mg do 20 mg), 3 do 5 razy na dobę.

Tabletki należy połykać w całości (bez rozgryzania i łamania), popijając płynem. Działanie obserwowano 15 minut po zażyciu. Leku **AuroGastro** nie należy podawać codziennie, w sposób ciągły przez długi czas bez badania przyczyn bólu brzucha.

Zwykle stosowana dawka dla dzieci w wieku 6-12 lat wynosi: 1 tabletką 3 razy na dobę.



Nie zaleca się stosowania leku **AuroGastro** u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia

Kiedy nie stosować leku **AuroGastro**:

- jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na hioscyny butylobromek lub na którykolwiek z pozostałych składników leku,
- jeśli u pacjenta występuje rozrost gruczołu krokowego,
- jeśli u pacjenta występuje zatrzymanie moczu jakichkolwiek zaburzeń dotyczących cewki moczowej i gruczołu krokowego,
- jeśli u pacjenta występuje przeszkoda mechaniczna przewodu pokarmowego (zwężenie przewodu pokarmowego) lub zwężenie odźwiernika,
- jeśli u pacjenta występuje porażenna lub obturacyjna niedrożność jelit (porażenie jelit),
- jeśli u pacjenta występuje tachykardia,
- jeśli u pacjenta występuje jaskra (problem dotyczący oczu),
- jeśli u pacjenta występuje choroba zwana „myasthenia gravis” (bardzo rzadki problem z osłabieniem mięśni),
- u pacjentów z rozdęciem okrężnicy (megacolon, znaczne poszerzenie fragmentu jelita grubego),
- jeśli u pacjenta występuje rzadka choroba dziedziczna, która może uniemożliwiać przyjmowanie którejkolwiek zawartej w nim substancji pomocniczej.

Skład

Substancja czynna to butyloskopalamina/hioscyny butylobromek. Każda tabletkowa powlekana zawiera 10 mg butyloskopalaminy (bromku butylohioscyny).

Inne składniki leku to: Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan, skrobia kukurydziana, kwas winowy, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy. Otoczka: sacharoza, talk (E 553b), hypromeloza 2910 (5mPas) (E 464), makrogol 4000 (E 1521), glicerolu monostearnian (E 471), triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, polisorbata 80 (E 433).