



# Bebiko 2 z NutriFlor mleko modyfikowane następne proszek 800 g

Cena: 57,01 zł



## Opis słownikowy

Producent	Nutricia
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.

## Opis produktu

### Postać

Mleko modyfikowane w proszku

### Opakowanie


Karton 800g

### Skład

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne, galaktooligosacharydy z mleka (8,24%), polifruktoza (0,58%), węglan wapnia, chlorek potasu, chlorek choliny, kwas L-askorbinowy, tauryna, lecytyna sojowa, L-askorbinian sodu, siarczan żelazawy, L-tryptofan, inozytol, octan DL-alfa-tokoferolu, L-izoleucyna, sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny, siarczan cynku, 5'-monofosforan cytydyny, chlorowodorek L-cysteiny, 5'-monofosforan adenozyne, sól sodowa 5'-monofosforanu inozyne, nikotynamid, sól sodowa 5'-monofosforanu guanozyny, L-karnityna, D-pantotenian wapnia, kwas foliowy, siarczan miedzi, palmitynian retinylu, DL-alfa-tokoferol, D-biotyna, chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, siarczan manganu, jodek potasu, fitomenadion, selenin sodu. Zawiera mieszaninę prebiotyków - galaktooligosacharydy (GOS) i fruktooligosacharydy (FOS).

### Działanie

Bebiko 2 zostało opracowane tak, aby dostarczało niezbędnych składników odżywczych i energii, których potrzebuje dziecko w drugim półroczu życia. Wspiera zdrowy rozwój dziecka dzięki zawartości: wapnia i witaminy D istotnych dla mocnych kości, żelaza ważnego dla rozwoju mózgu oraz opatentowanej kompozycji prebiotyków NUTRICIA (w tym błonnika) dla zdrowej flory bakteryjnej w jelitach, która



Jest częścią zdrowego układu trawiennego. Bebiko 2 może być zarówno samodzielnym posiłkiem, jak też służyć do przygotowania kleików i bezmlecznych kaszek oraz innych mlecznych posiłków, np. budyniu, płatków z mlekiem, naleśników itp. Nie wymaga gotowania.

#### **Wskazania**

Przeznaczone dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia.

#### **Sposób użycia**

Bebiko 2 może być zarówno samodzielnym posiłkiem, jak też służyć do przygotowania kleików i bezmlecznych kaszek BoboVita oraz innych mlecznych posiłków, np. kakao, budyniu, płatków z mlekiem, naleśników. Należy stosować się do tabeli żywienia. Podano w niej przeciętną wielkość i ilość posiłków spożywanych przez niemowlę w ciągu doby. Dla dzieci w wieku od 7. miesiąca życia należy rozpuścić 7 płaskich miareczek proszku w 210ml wody i podawać 3 porcje mleka na dobę.