

Cena: 57,10 zł



Opis słownikowy

Producent	USP ZDROWIE
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Postać

Kapsułki

Opakowanie

30 kapsułek

Skład

ActiBPF - sproszkowany sok z owoców bergamoty (*Citrus bergamia* Risso) standaryzowany na zawartość 32% BPF (ang. Bergamot-derived Polyphenolic Fraction); ekstrakt z czosnku (*Allium sativum*) standaryzowany na zawartość 10 000 ppm (ang. parts per milion) allicyny; otoczka kapsułki roślinnej: hydroksypropylometyloceluloza; substancja żelująca: guma gellan; barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza

SKŁADNIK

ActiBPF (sproszkowany sok z owoców bergamoty standaryzowany na 32% polifenoli
Ekstrakt z czosnku

w tym allicyna

ZAWARTOŚĆ W 1 KAPSUŁCE

250 mg

200 mg

2 mg

Nie zawiera cukru, nie zawiera laktozy, nie zawiera alergenów, nie zawiera GMO

Działanie



BERIMAL pomaga zadbać o prawidłowy poziom cholesterolu. Zawiera wyjątkowy składnik **ActiBPF**, czyli przebadaną naukowo standaryzowaną kompozycję polifenoli z bergamoty *Citrus bergamia Risso*.

Dodatkowo **BERIMAL** wzmocniony został standaryzowanym na wysoką zawartość allicyny ekstrakt z czosnku pospolitego *Allium sativum*, dzięki czemu:

- pomaga zadbać o utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu we krwi
- wspomaga mikrokążanie krwi oraz zdrowie całego układu krążenia
- reguluje poziom glukozy we krwi
- wykazuje działanie antyoksydacyjne

Zastosowana w preparacie innowacyjna technologia kapsułek **DRcaps** pozwala dotrzeć zawartości kapsułek do miejsca absorpcji, zapewniając jak największą tolerancję preparatu.

Wskazania

Utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu

Sposób użycia

Zalecana dawka: 1-2 kapsułki przed posiłkiem. Kapsułkę połknąć i popić wodą.

Nie jest zalecane wsypywanie zawartości kapsułki do pożywienia, gdyż może zmienić smak potrawy.

Ostrzeżenia

Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia, nie jest zalecane spożywanie podczas ciąży, karmienia piersią, osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe lub hipolipemizujące oraz osoby po zabiegach operacyjnych stosowanie preparatu powinny skonsultować się z lekarzem, preparat nie może być stosowany przez osoby o obniżonym ciśnieniu krwi, cierpiące na ostry nieżyt żołądka i jelit oraz ciężkie schorzenia wątroby.