

Betadine VAG 200 mg globulki 7 szt. (Iodówka - tylko odbiór osobisty)

Cena: 24,65 zł



Opis słownikowy

Dawka	200 mg
Opakowanie	7 szt.
Postać	globulki dopochwowe
Producent	EGIS PHARMACEUTICALS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Polyvidonum iodinum

Opis produktu

Postać

Globulki dopochwowe

Opakowanie

7 szt.

Działanie

Betadine VAG to lek w postaci globulek do stosowania dopochwowego. Zawiera substancję czynną jodowany powidon, który jest związkiem kompleksowym jodu z powidonem - po zastosowaniu dopochwowego uwalnia jod. Jod działa na bakterie Gram-dodatnie oraz Gram-ujemne, wirusy, grzyby, jak również niektóre pierwotniaki.

Wskazania

Leczenie zakażeń pochwy u kobiet dorosłych oraz dziewcząt po okresie pokwitania.

Sposób użycia

Betadine VAG należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta, lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.



Stosowanie dopochwowe.

Nie należy podgrzewać przed aplikacją. Lek **Betadine VAG** jest przeznaczony do stosowania u dorosłych kobiet i u dziewcząt po okresie pokwitania.

Dorośli

Zaleca się stosować 1 globulkę dopochwowo raz na dobę przez 7 dni. W razie braku poprawy należy zgłosić się do lekarza. Zaleca się zwilżenie globulki przed użyciem, a następnie wprowadzenie jej głęboko do pochwy wieczorem przed położeniem się spać.

Aplikacja globulki:

- Należy oddzielić jedną globulkę od paska, rozrywając wzdłuż perforacji w miejscu cięcia „V”.
- Chwycić plastikowe zakładki obiema rękami i odciągnąć, aby wyjąć globulkę z opakowania.

Zaleca się także stosowanie podpasek w trakcie leczenia.

Istotne jest, aby zwilżyć globulkę przed jej założeniem w celu zapewnienia maksymalnego rozpuszczenia się substancji czynnej oraz uniknięcia miejscowego podrażnienia. Przerwanie leczenia nie jest konieczne nawet po wystąpieniu krwawienia miesięczkowego.

Ostrzeżenia

Leku **Betadine VAG** nie należy stosować:

- jeśli pacjentka ma uczulenie na jodowany powidon lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli tarczycyca pacjentki nie działa prawidłowo (pacjentka ma stwierdzoną nadczynność tarczycy lub inne objawowe zaburzenia czynności tarczycy,
- przed, w trakcie i po leczeniu jodem radioaktywnym oraz scyntygrafii,
- w opryszczkopodobnym zapaleniu skóry (tak zwanym opryszczkowym zapaleniu skóry Duhringa),
- u dziewcząt przed okresem pokwitania (przed wystąpieniem pierwszej miesiączki),
- u kobiet w ciąży i karmiących piersią,
- jeśli pacjentka stosuje produkty zawierające rtęć, ponieważ jednoczesne stosowanie leku Betadine VAG z produktami zawierającymi rtęć może spowodować uszkodzenie skóry.

Skład

Substancją czynną leku jest jodowany powidon. Każda globulka zawiera 200 mg jodowanego powidonu. Pozostały składnik leku to: makrogol 1000.