



Biosteron 10 mg tabletki 60 szt.



Cena: 43,23 zł

Opis słownikowy

Producent	LEKAM
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki

Opakowanie

60 tabletek

Dawka

10 mg

Działanie

DHEA to hormon steroidowy, naturalnie wytwarzany w organizmie, w warstwie siatkowatej nadnerczy, a którego produkcja zmniejsza się wraz z wiekiem. Obniżający się poziom DHEA prowadzi do jego niedoboru, który może być przyczyną niekorzystnych zmian związanych ze starzeniem się (np. obniżenie libido i potencji, uczucie nadmiernego zmęczenia, osłabienie pamięci i zdolności koncentracji).

Biosteron to preparat odpowiedni dla kobiet i mężczyzn, pomaga radzić sobie z tymi problemami poprzez uzupełnienie niedoboru DHEA.

Wskazania

Uzupełnienie diety w DHEA, które niedobór może być przyczyną niekorzystnych zjawisk związanych z procesem starzenia się np.:



- osłabienie pamięci, sprawności intelektualnej, zdolności koncentracji
- zaburzenia snu
- pogorszenie samopoczucia i depresja
- dolegliwości psychiczne i fizyczne związane z okresem menopauzy u kobiet i andropauzy u mężczyzn
- otyłość, zmniejszona wrażliwość tkanek na insulinę, która może powodować cukrzycę
- zmniejszenie siły mięśni, uczucie nadmiernego zmęczenia, zespół przewlekłego zmęczenia
- zmniejszenie odporności na stres
- spadek popędu płciowego i zmniejszenie sprawności seksualnej
- miażdżyca
- spadek odporności organizmu na zakażenia wirusowe i bakteryjne.

Sposób użycia

Biosteron należy przyjmować raz na dobę, rano, zgodnie z naturalnym rytmem wydzielania DHEA. Lek należy przyjmować z posiłkiem, aby ułatwić jego wchłanianie.

Zalecana początkowa, jednorazowa dawka dobową - 5mg (dla kobiet) / 10mg (dla mężczyzn).

Początkową dawkę leku należy stopniowo zwiększać (o 5 do 10mg co 2 tygodnie).

Maksymalna dawka dobową DHEA zalecana kobietom wynosi 25mg, a mężczyznom 50mg. Efekt działania leku nie jest natychmiastowy i występuje po kilku tygodniach przyjmowania, dlatego Biosteron jest przeznaczony do długotrwałego stosowania.

Ostrzeżenia

Nie stosować preparatu w przypadkach: jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Biosteron, jeśli u pacjenta występuje rak piersi, jajnika lub inny nowotwór zależny od estrogenów, jeśli u pacjenta występuje łagodny rozrost i rak gruczołu krokowego, rak sutka u mężczyzn, jeśli pacjent choruje na ciężką niewydolność wątroby, jeśli pacjent choruje na ciężką niewydolność nerek, w okresie ciąży i karmienia piersią.

Skład

Substancja czynna - dehydroepiandrosteron (DHEA, Dehydroepiandrosteronum). 1 tabletkę zawiera 10 mg DHEA. Substancje pomocnicze - krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.