



# BOIRON Chamomilla Vulgaris 15 CH granulki 4 g

Cena: 14,45 zł



## Opis słownikowy

Producent	BOIRON
Rejestracja	Lek homeopatyczny

## Opis produktu

### Postać

Granulki

### Opakowanie

4g (około 80 granulek)

### Poziom rozcieńczenia

15 CH

### Opis

*Chamomilla Vulgaris* (rumianek pospolity) jest rośliną jednoroczną należącą do rodziny Złożonych, spotykaną wśród leśnych traw. Ta aromatyczna roślina zawiera związki aktywne farmakologiczne, do których należą:

- flawonoidy o lekkim działaniu uspokajającym i narkotycznym
- gorzkie substancje o właściwościach żółciotwórczych i moczopędnych
- olejki eteryczne (zawierające węglowodór seskwiterpenowy, chamazulen i alfa-bisabolol oraz jego pochodne)

Te substancje wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i gojące owrzodzenia. Według badań przeprowadzonych na działaniem patogenicznym na *Chamomilla Vulgaris* ustalono, że działa ona w obrębie:



- układu nerwowego
- błon śluzowych przewodu pokarmowego i układu oddechowego oraz
- wywołuje zespół gorączkowy ze zmianami zapalnymi

#### Wskazania

Stany gorączkowe i ból w okresie ząbkowania, poprawa nastroju. Lek zalecany jest u **niemowląt w okresie ząbkowania, kapryśujących dzieci, osób dorosłych łatwo wpadających w stan rozdrażnienia, nerwowych, nadwrażliwych na ból**, łatwo unoszących się gniewem, które na co dzień są uprzejme i spokojne.

#### Sposób użycia

Dolegliwości bólowe u niemowląt związane z zaburzeniami ząbkowania: Należy stosować preparat w rozcieńczeniu **15 CH**, pięć granulek, co kwadrans lub co pół godziny. Ulga zazwyczaj występuje zwykle po 10-15 minutach od przyjęcia leku. Wraz z poprawą należy zwiększać odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami leku.

Stany gorączkowe w przebiegu ząbkowania mogące przebiegać z odczynowym zapaleniem ucha, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, zapaleniem oskrzeli: Należy stosować w rozcieńczeniu **9 CH**, pięć granulek (w przypadku silnych dolegliwości bólowych podawać w rozcieńczeniu 15 CH), dwa do czterech razy dziennie, w zależności od nasilenia objawów.

Zaburzenia charakterologiczne i zmiany zachowania: Zarówno u dorosłych, jak i u dzieci lek należy przepisywać w rozcieńczeniu **15 CH**, od pięciu granulek dziennie do jednej dawki tygodniowo, albo podawać w rozcieńczeniu 15 lub **30 CH** co drugi dzień.

U osób z nietolerancją bólu (nadwrażliwych, nerwowych bez względu na etiologię bólu): bóle zębów, rwa kulszowa, kolka wątrobowa, nerkowa, kolki jelitowe, bolesne miesiączki: Podawanie preparatu w rozcieńczeniu od 9 do 30 CH, w zależności od stopnia podobieństwa, może przynieść znaczącą poprawę.