



apteka
w sieci

BOIRON Chamomilla Vulgaris 30 CH granulki 4g

Apteka "Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

Cena: 15,26 zł

Opis słownikowy

Producent	BOIRON
Rejestracja	Lek homeopatyczny



Opis produktu

Postać

Granulki

Opakowanie

4g (około 80 granulek)

Poziom rozcieńczenia

30 CH

Opis

Chamomilla Vulgaris (rumianek pospolity) to roślina jednoróżna spotykana wśród leśnych traw. Zawiera związki, które między innymi wykazują działanie uspokajające (flawonoidy), moczopędne i żółciotwórcze (gorzkie substancje). Są to także olejki eteryczne. Rumianek pospolity wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze. Działa także w obrębie układu nerwowego, oddechowego, błon śluzowych przewodu pokarmowego.

Wskazania

Chamomilla Vulgaris jest polecana na ból i stany gorączkowe w okresie ząbkowania, a także dla osób dorosłych wrażliwych na ból, nerwowych, rozdrażnionych, łatwo unoszących się gniewem.

Dawkowanie i sposób użycia należy skonsultować z lekarzem homeopatą. Opis nie zastępuje wizyty lekarskiej. Nie stosować w razie



nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Przechowywać poza dostępem dzieci.

Sposób użycia

apteka
w sieci

Dolegliwości bólowe u niemowląt (związane z ząbkowaniem): Należy stosować preparat w rozcieńczeniu **15 CH**, pięć granulek, co kwadrans lub co pół godziny. Ulga zazwyczaj występuje zwykle po 10-15 minutach od przyjęcia leku. Wraz z poprawą należy zwiększać odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami leku.

Stany gorączkowe w przebiegu ząbkowania mogące przebiegać z odczynowym zapaleniem ucha, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, zapaleniem oskrzeli: Należy stosować w rozcieńczeniu **9 CH**, pięć granulek (w przypadku silnych dolegliwości bólowych podawać w rozcieńczeniu 15 CH), dwa do czterech razy dziennie, w zależności od nasilenia objawów.

Zaburzenia charakterologiczne i zmiany zachowania: Zarówno u dorosłych, jak i u dzieci lek należy przepisywać w rozcieńczeniu **15 CH**, od pięciu granulek dziennie do jednej dawki tygodniowo, albo podawać w rozcieńczeniu 15 lub **30 CH** co drugi dzień.

U osób z nietolerancją bólu (nadwrażliwych, nerwowych bez względu na etiologię bólu): bóle zębów, rwa kulszowa, kolka wątrobowa, nerkowa, kolki jelitowe, bolesne miesiączki: Podawanie preparatu w rozcieńczeniu od 9 do 30 CH, w zależności od stopnia podobieństwa, może przynieść znaczącą poprawę.