



apteka
w sieci

Canespor (Mycospor) 1% krem 15 g

Apteka "Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

Cena: 51,39 zł



Opis słownikowy

Producent	BAYER
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Producent:

BAYER PHARMA

Postać

Krem

Opakowanie

Tubka 15g

Skład

1g kremu zawiera 10 mg bifonazolu. Substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, alkohol cetylostearylowy, palmitynian cetylowy, polisorbát 60, oktylododekanol, woda oczyszczona, monostearnian sorbitanu.

Działanie

Lek zawiera substancję czynną bifonazol o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Skuteczny wobec wielu gatunków dermatofitów i drożdżaków oraz pleśni i innych grzybów chorobotwórczych

Wskazania

Lek jest wskazany w miejscowym leczeniu zakażeń grzybiczych skóry, takich jak grzybica rąk i nóg, grzybica tułowia, grzybica ładów skórnych, łupież pstry, grzybnice powierzchniowe skóry, łupież rumieniowaty. Bardzo dobrze przenika do wszystkich warstw naskórka

Dawkowanie

Lek zwykle stosuje się raz na dobę, najlepiej wieczorem, przed położeniem się do łóżka. Na chorobowo zmienione miejsca na skórze należy nanieść ciekłą warstwę leku i wetrzeć. Do pokrycia powierzchni skóry wielkości dłoni wystarczy niewielka ilość kremu. Czas trwania leczenia. Aby nastąpiło całkowite wyleczenie zakażenia zaleca się stosowanie leku.



- w grzybicy stóp, grzybicy między palcami stóp 3 tygodnie
- w grzybicy tułowia, grzybicy rąk i w fałdach skórnych od 2 do 3 tygodni
- w łupieżu pstrym, w łupieżu rumieniowatym 2 tygodnie
- powierzchniowej kandydozie skóry od 2 do 4 tygodni.

U małych dzieci lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie i pod kontrolą lekarza.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na biofonazol, alkohol cetylostearylowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na inne związki pochodne imidazolu (klotrymazol, ekonazol, mikonazol). Stosowanie na błony śluzowe i uszkodzoną skórę.