



CAPRICARE 1 Mleko początkowe oparte na mleku kozim, od urodzenia 400g

Cena: 53,63 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	24 godziny
Producent	MIRALEX
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu

Postać

Mleko w proszku

Opakowanie

Puszka 400g

Skład

Pasteryzowane pełne mleko kozie, laktoza (z mleka), oleje roślinne (wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, przeciwutleniacze (lecytyna słonecznikowa, mieszanina tokoferoli)), pasteryzowane sproszkowane mleko kozie, sole mineralne (cytrynian wapnia, cytrynian sodu, wodorotlenek wapnia, siarczan żelazawy, chlorek potasu, siarczan cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu), witaminy (kwas L-askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, nikotynamid, octan retinolu, cholekalcyferol, D-pantotenian wapnia, filochinon, cyjanokobalamina, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, D-biotyna), chlorek cholicy, L-tryptofan, L-izoleucyna, tauryna, L-karnityna.

100ml gotowego mleka zawiera: wartość energetyczna 280kJ/66kcal; białko 1,3g; węglowodany 7,4g, laktoza 7,4g; tłuszcz 3,4g, w tym: (nasycone kwasy tłuszczowe 1,3g; jednonienasycone kwasy tłuszczowe 1,6g; wielonienasycone kwasy tłuszczowe 0,54g); kwas linolowy 0,39g; kwas-linolenowy 58mg; witamina A 70µg-RE; witamina D 1,10µg; witamina E 1,5mg alfa-TE; witamina K 6,7µg; witamina C 10mg; tiamina 62µg; ryboflawina 120µg; niacyna 0,68mg; witamina B6 36µg; kwas foliowy 8,7µg; kwas pantotenowy 0,35mg; witamina B12 0,18µg; biotyna 2,3µg; sód 18mg; potas 74mg; wapń 65mg; fosfor 43mg; magnez 5,9mg; żelazo 0,71mg; cynk 0,49mg; miedź 45µg; mangan 8,4µg; fluorki 6,5µg; selen 1,2µg; jod 8,1µg; cholina 13mg; tauryna 4,6mg; karnityna 0,90mg; inozytol 3,9mg.



Działanie

Mleko Capricare to pełnowartościowe mleko początkowe przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią lub jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli istnieje konieczność dokarmiania. Mleko początkowe od 1 dnia życia to produkt oparty na kozim mleku, który jest łagodny z natury i zawiera wszystkie składniki odżywcze potrzebne niemowlęciu w pierwszych dniach życia, kiedy z różnych przyczyn nie może być karmione piersią matki lub jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli istnieje konieczność dokarmiania.

Wskazania

Mleko początkowe przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią lub jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli istnieje konieczność dokarmiania.

Sposób użycia

Zawsze należy dodać 1 miarkę proszku (4,3g) do 30 ml wody. Umyj ręce przed przygotowaniem butelki dla dziecka. Wysterylizuj wszystkie elementy butelki, gotując je lub korzystając ze specjalnego urządzenia do sterylizacji. Zagotuj świeżą wodę i pozostaw ją do ostudzenia (około 40-45 stopni Celsjusza). Wlej dokładnie odmierzoną ilość ostudzonej, przegotowanej wody do sterylnej butelki. Jeśli korzystasz z miarki Capricare delikatnie napełnij ją proszkiem i wyrównaj poziom. Nie ubijaj i nie nabieraj czubatej miarki proszku. Dodaj wymaganą liczbę miarek do ostudzonej, przegotowanej wody. Zawsze dodawaj 1 miarkę proszku (4,3 g) na każde 30 ml wody. Zamknij butelkę i potrząśnij nią energicznie do całkowitego rozpuszczenia proszku. Sprawdź temperaturę mleka, wylewając kilka kropli na swój nadgarstek.

0-1 miesiąc: 3 miarki, 6-7 karmień na dobę. 1 – 2 miesiąc: 4 miarki, 5-7 karmień na dobę. 2 – 3 miesiąc: 5 miarek, 5 dodatkowych karmień. 3 – 4 miesiąc: 6 miarek, 5 karmień na dobę. 4 - 6 miesiąc: 7 miarek, 4 karmień na dobę. Po 6 miesiącu: 8 miarek, 3-4 karmień na dobę.

Uwaga

Używaj tylko załączonej miarki Capricare i stosuj zalecane dawkowanie. Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących przygotowania i przechowywania mleka może powodować zagrożenie dla zdrowia dziecka. Nie przechowuj niewypitej porcji mleka. Przechowywać zamkniętą puszkę w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu szczelnie zamknąć i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Zużyć zawartość w ciągu 4 tygodni po otwarciu. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno stanowić wyłączone źródło pokarmu przez pierwsze 6 miesięcy życia. Przed podjęciem decyzji o karmieniu mlekiem modyfikowanym, należy skonsultować się z lekarzem pediatrą.