



CAPRICARE 2 Mleko następne na mleku kozim - dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia data ważności 07.08.2024r

Cena: 44,60 zł



Opis słownikowy

Producent	MIRALEX
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu

Postać

Mleko w proszku

Opakowanie

Puszka 400g

Skład

Pasteryzowane pełne mleko kozie, laktoza (z mleka), oleje roślinne (wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, przeciwutleniacze (lecytyna słonecznikowa, mieszanina tokoferoli)), pasteryzowane sproszkowane mleko kozie, sole mineralne (cytrynian wapnia, cytrynian sodu, wodorofosforan wapnia, wodorotlenek wapnia, siarczan żelazawy, chlorek potasu, siarczan cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu), witaminy (kwas L-askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, nikotynamid, octan retinolu, cholekalcyferol, D-pantotnian wapnia, filochinon, cyjanokobalamina, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, D-biotyna), chlorek cholinyl, L-tryptofan, L-izoleucyna, tauryna.

100ml gotowego mleka zawiera: wartość energetyczna 280kJ/66kcal; białko 1,3g; węglowodany 7,4g, laktoza 7,4g; tłuszcz 3,4g, w tym: (nasycone kwasy tłuszczowe 1,3g; jednonienasycone kwasy tłuszczowe 1,6g; wielonienasycone kwasy tłuszczowe 0,54g); kwas linolowy 0,39g; kwas-linolenowy 58mg; witamina A 70µg-RE; witamina D 1,10µg; witamina E 1,5mg alfa-TE; witamina K 6,7µg; witamina C 10mg; tiamina 62µg; ryboflawina 120µg; niacyna 0,68mg; witamina B6 36µg; kwas foliowy 8,7µg; kwas pantotenowy 0,35mg; witamina B12 0,18µg; biotyna 2,3µg; sód 18mg; potas 74mg; wapń 65mg; fosfor 43mg; magnez 5,9mg; żelazo 0,71mg; cynk 0,49mg; miedź 45µg; mangan 8,4µg; fluorki 6,5µg; selen 1,2µg; jod 8,1µg; cholina 13mg; tauryna 4,6mg; karnityna 0,90mg; inozytol 3,9mg.



Mleko modyfikowane na bazie mleka koziego stanowi naturalną alternatywę dla popularnych, wysokoprzetworzonych mlek modyfikowanych na bazie mleka krowiego. Mleko Capricare to pełnowartościowe mleko następne, przeznaczone dla niemowląt od 6 miesiąca życia. Mleko Capricare jest łagodne dla żołądka, a jego delikatny smak bazuje na naturalnych walorach pełnego mleka koziego, co powoduje, że zarówno mama jak i dziecko doświadczają prawdziwej radości z karmienia.

Wskazania

Mleko następne przeznaczone dla niemowląt od 6 miesiąca życia.

Sposób użycia

Zawsze należy dodać 1 miarkę proszku (4,3g) do 30 ml wody. Umyj ręce przed przygotowaniem butelki dla dziecka. Wysterylizuj wszystkie elementy butelki, gotując je lub korzystając ze specjalnego urządzenia do sterylizacji. Zagotuj świeżą wodę i pozostaw ją do ostudzenia (około 40-45 stopni Celsjusza). Wlej dokładnie odmierzoną ilość ostudzonej, przegotowanej wody do sterylnej butelki. Jeśli korzystasz z miarki Capricare delikatnie napełnij ją proszkiem i wyrównaj poziom. Nie ubijaj i nie nabieraj czubatej miarki proszku. Dodaj wymaganą liczbę miarek do ostudzonej, przegotowanej wody. Zawsze dodawaj 1 miarkę proszku (4,3 g) na każde 30 ml wody. Zamknij butelkę i potrząśnij nią energicznie do całkowitego rozpuszczenia proszku. Sprawdź temperaturę mleka, wylewając kilka kropli na swój nadgarstek.

0-1 miesiąc: 3 miarki, 6-7 karmień na dobę. 1 – 2 miesiąc: 4 miarki, 5-7 karmień na dobę. 2 – 3 miesiąc: 5 miarek, 5 dodatkowych karmień. 3 – 4 miesiąc: 6 miarek, 5 karmień na dobę. 4 - 6 miesiąc: 7 miarek, 4 karmień na dobę. Po 6 miesiącu: 8 miarek, 3-4 karmień na dobę.

Uwaga

Używaj tylko załączonej miarki i stosuj zalecane dawkowanie. Nieprzestrzegaj zaleceń dotyczących przygotowania i przechowywania mleka może powodować zagrożenie dla zdrowia dziecka. Nie przechowuj niewypitej porcji mleka. Przechowywać zamkniętą puszkę w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu szczelnie zamknąć i przechowywać w chłodnym miejscu. Zużyć zawartość w ciągu 4 tygodni po otwarciu. Zapakowane w atmosferze ochronnej. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Mleko następne Capricare jest przeznaczone dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. Mleko to powinno stanowić część zróżnicowanej diety niemowląt i nie powinno być stosowane jako zamiennik mleka matki przez pierwsze 6 miesiące życia. decyzję o wprowadzeniu żywienia uzupełniającego, szczególnie przed ukończeniem 6. miesiąca życia, należy skonsultować z lekarzem pediatrą, uwzględniając indywidualne potrzeby niemowlęcia w zakresie wzrostu i rozwoju.