

Carbo Medicinalis VP 300 mg tabletki x 20 szt.

Cena: 14,20 zł



Opis słownikowy

Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki

Opakowanie

20 szt.

Działanie

Carbo Medicinalis VP zawiera substancję czynną węgiel aktywny, będący odpowiednio przygotowanym węglem, który jest sproszkowanym węglem aktywowanym. Podany doustnie węgiel aktywny wiąże różne substancje obecne w przewodzie pokarmowym, w tym związki nasilające perystaltykę (czynność ruchową) jelit i przenikanie wody do światła jelit, toksyny bakteryjne, leki, bakterie, gazy jelitowe, produkty gnilne i substancje toksyczne, dzięki czemu uniemożliwia ich wchłanianie z przewodu pokarmowego. Uniemożliwia również wtórne wchłanianie substancji wydalonych do jelit np. z żółcią.


Wskazania

Biegunka, niestrawność, wzdęcia oraz zatrucia lekami i innymi związkami chemicznymi (po porozumieniu się z lekarzem).

Sposób użycia

NIESTRAWNOŚĆ I WZDĘCIA

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat



Stosować doustnie, przeciętnie 3 do 4 tabletek kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Tabletki można połykać w całości, jednak w celu uzyskania szybszego działania zalecane jest ich rozgryzanie

BIEGUNKI

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Jednorazowo doustnie około 4,0 g (10 do 13 tabletek), najlepiej w postaci przygotowanej z rozkruszonych tabletek wodnej papki. Dawkę można powtarzać co kilka godzin, jeśli to konieczne.

ZATRUCIA LEKAMI I ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI

Dorośli i dzieci powyżej 1. roku życia

Jednorazowo dawka doustna wynosi zwykle około 12,5 g (41 do 42 tabletek). W razie potrzeby można ją podawać kilka razy w ciągu doby.

Dzieci poniżej 1 roku

Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle 1g/kg mc. W razie potrzeby można ją powtarzać co 4-6 godzin.

W leczeniu zatruc lekami i substancjami chemicznymi lek podaje się najczęściej w postaci zawiesiny wodnej, np. do płukania żołądka. Sporządza się ją mieszając rozkruszone tabletki z 400ml wody destylowanej. Zawiesina powinna mieć konsystencję gęstej śmietany. Podaje się ją w zalecanej dawce doustnie przez zgłębnik i usuwa przez odessanie lub wywołanie wymiotów odzyskując całkowitą ilość podanego węgla.

Ostrzeżenia

Leku nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na węgiel aktywny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent jest nieprzytomny a jednocześnie nie ma w odpowiedni sposób zabezpieczonych dróg oddechowych.

Skład

Substancją czynną leku jest węgiel aktywny. Jedna tabletką zawiera 300mg węgla aktywnego. Pozostałe składniki to: sacharoza, celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna, karboksymetyloskrobia sodowa, glicerol, magnezu stearynian.