

Cicatridina globulki dopochwowe 2 g 10 szt

Cena: 29,54 zł



Opis słownikowy

Producent	FARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Postać leku:

Globulki dopochwowe

Dawka:

5 mg

Opakowanie:

10 globulek po 2 g

Skład:

Sól sodowa kwasu hialuronowego 5 mg, Centella Asiatica - wyciąg olejowy, wyciąg olejowy z nagietka, wyciąg olejowy z aloesu, olejek z drzewa herbacianego, glicerydy półsyntetyczne, BHT

Działanie:

Przyspiesza zabliznianie się ran w pochwie; przywraca naturalny proces gojenia; odbudowuje błonę śluzową pochwy w procesach atrofii i dystrofii; łagodzi takie objawy jak: uczucie napięcia i suchości pochwy, świąd, pieczenie, bóle przy współżyciu płciowym - już w pierwszym tygodniu stosowania.

Wskazania:



Preparat wspomagający proces regeneracji błony śluzowej pochwy w stanach atrofii i dystrofii. Wspomaga gojenie się ran po porodzie, zabiegach ginekologicznych, dystrofii spowodowanej chemioterapią lub naświetlaniem jonizującym oraz w przypadku suchości pochwy, wywołanej również niedoborem estrogenów.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie:

Stosować jedną globulkę wieczorem lub według wskazań lekarza. Wyjąć globulkę pociągając za końce nadciętego blistra i włożyć ją głęboko do pochwy. Należy umyć ręce przed i po użyciu wyrobu medycznego.