



Claritine Allergy 10mg (SPE) tabletki 7 szt.

Cena: 14,95 zł



Opis słownikowy

Producent	MSD POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki

Opakowanie

1 op. 7 tabletek

Skład

1 tabletkę powlekana zawiera: substancję czynną: loratadynę 10mg oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian.

Działanie

Lek Claritine SPE zawiera loratadynę, która jest pochodną piperydiny. Jest długo działającym, trójcyklicznym lekiem przeciwhistaminowym wybiórczo blokującym obwodowe receptory histaminowe H1. Hamuje działanie histaminy powodującej między innymi występowanie wysypki i świądu. Nie wywiera działania uspokajającego i nie powoduje senności, nie działa również przeciwcholinergicznie. Bardzo dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Początek działania obserwuje się po 1-3 godzinach.

Wskazania

Leczenie objawów związanych z alergicznym nieżytem nosa (kichanie, obrzęk błony śluzowej nosa, wyciek z nosa), świąd i pieczenie oczu. Lek ten jest również wskazany w leczeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.



Sposób użycia

apteka

Stosować przed jedzeniem. Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: 1 tabletkę (10 mg) raz na dobę. Dzieci od 2 do 6 lat-1/2 tabletki (5 mg) raz na dobę. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania

:Nadwrażliwość na substancję czynną (loratadynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować produktu leczniczego Claritine Allergy w okresie ciąży.

Działania niepożądane

Najczęściej obserwowano - senność, ból głowy, zmęczenie, uczucie suchości w jamie ustnej. Bardzo rzadko występują: nadkomorowe zaburzenia rytmu, nudności, zwiększenie łaknienia, zapalenie błony śluzowej żołądka, wysypka, łysienie, anafilaksja, nieprawidłowa czynność wątroby.>