

## DeflaGyn Zestaw do podawania 150ml (2 aplikatory)

Cena: 172,01 zł



### Opis słownikowy

Producent	EXELTIS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Postać

Żel

#### Opakowanie

- Pojemnik 150ml
- Aplikator wielokrotnego użytku x 2 szt.

#### Działanie

**Deflagyn** to żel dopochwowy wspomagający remisję w przypadku nieprawidłowego wyniku cytologii szyjki macicy. Żel wiąże patogeny, zapobiega ich rozprzestrzenianiu oraz wprowadza ochronę antyoksydacyjną.

Żel dopochwowy wspomaga spontaniczną remisję i regresję:

- nieprawidłowych wyników cytologii szyjki macicy (ASC-US (Atypowe komórki nabłonkowe, gdzie nie może wykluczyć obecności zmian HSIL), LSIL (Zmiany małego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego), HSIL (Zmiany małego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego) / PAP II-p, PAP-III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (Munich III) / PAP III, PAP IIID);
- zmian na szyjce macicy wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV);
- zmian na szyjce macicy z dodatnim wynikiem biomarkerów p16/Ki-67;



nienowotworowych zmian na szyjce macicy.

#### Sposób użycia

1. Umieścić butelkę DeflaGyn na płaskiej powierzchni. Odkręcić korek butelki i włożyć końcówkę aplikatora do otworu butelki.
2. Butelkę DeflaGyn z nałożonym aplikatorem należy obrócić do góry dnem (o 180°). Nabrać 5ml żelu, delikatnie pociągając tłok aplikatora do momentu kiedy koniec tłoka wskaże objętość 5ml, a następnie obrócić butelkę i zdjąć napełniony aplikator z butelki.
3. Pacjentka powinna położyć się na plecach, umieszczając poduszkę pod miednicą. Wprowadzić aplikator głęboko do pochwy (do momentu, gdy dotknie szyjki macicy). Wprowadzenie aplikatora może być łatwiejsze przy zgiętych kolanach. Po wprowadzeniu aplikatora we właściwe położenie należy wolno wcisnąć tłok, aby podać żel, a następnie wyjąć aplikator z pochwy. Żel dopochwowy najlepiej aplikować wieczorem.
4. Pacjenta powinna pozostać w pozycji leżącej na plecach przez około 1 minutę. Należy upewnić się, że miednica w dalszym ciągu jest uniesiona. Dzięki temu żel zostanie w odpowiedni sposób rozprowadzony na szyjce macicy.
5. Umyć dokładnie aplikator po użyciu. Oddzielić rurkę od popychacza aplikatora. Umyć ręcznie obydwie części aplikatora w ciepłej wodzie (w temperaturze do 50°C). Nie myć w zmywarce. Wysuszyć obydwie części aplikatora, po czym złożyć z powrotem w całość. Aplikator może być używany do 28 razy, jeśli jest myty po każdym użyciu.

6. Utylizacja zużytego aplikatora. Zużyty i czysty aplikator może zostać zutytylizowany w recyklingu plastiku, jeśli to możliwe, lub razem z odpadami gospodarstwa domowego.

#### Jak długo należy stosować Deflagyn

##### Pacjentki niemiesiączkujące

Produkt należy stosować przez trzy okresy po 28 dni. Po 28 dniach leczenia należy przerwać stosowanie żelu dopochwowego DeflaGyn na 3 dni. Następnie należy kontynuować leczenie przez kolejne 28 dni i ponownie przerwać na kolejne 3 dni. Następnie należy kontynuować leczenie rozpoczynając trzeci cykl leczenia

##### Pacjentki miesiączkujące

Żelu dopochwowego nie należy stosować w trakcie miesiączki (przez około 3-5 dni w cyklu). Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych 3 dni przerwy, gdyż miesiączkę należy traktować jak przerwę w leczeniu.

#### Ostrzeżenia

Nie należy stosować leku, jeżeli posiada się nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. W trakcie stosowania leku nie stosować innych preparatów dopochwowych. Nie stosować w trakcie miesiączki.

#### Skład

DeflaGyn żel dopochwowy zawiera: wysoce dyspergowany dwutlenek krzemu, kwas cytrynowy, selenian sodu. Substancje pomocnicze: hydroksyetyloceluloza, woda. Substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoosan sodu.