



Deflegmin 30mg tabletki 20 szt.

Cena: 14,15 zł



Opis słownikowy

Producent	PHARMASWISS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać leku

Tabletki

Dawka

30 mg

Opakowanie

20 tabletek

Skład

1 tabletkę zawiera 30 mg chlorowodoru ambroksolu.

Działanie

Ambroksol to metabolit bromheksydyny o działaniu mukolitycznym. Uplętnia wydzielinę oskrzelową i zmniejsza lepkość śluzu prawdopodobnie na drodze depolimeryzacji makrocząsteczek kwaśnych mukopolisacharydów. Dzięki temu ułatwia odkrztuszanie, zwiększa drożność oskrzeli, łagodzi kaszel. Zwiększa także częstość ruchów rzęsek i przyspiesza transport śluzowo - rzęskowy. Pobudza wytwarzanie substancji powierzchniowo czynnej (surfaktantu) przez pneumocyty typu II i komórki Clara. Surfaktant ułatwia oddzielenie pasm lepkiego śluzu od ściany oskrzeli i ich transport na całej długości drzewa oskrzelowego, a zwłaszcza w drobnych pozbawionych rzęsek oskrzelach. Surfaktant pobudza także aktywność fagocytarną makrofagów, chroniąc nabłonek dróg oddechowych przed chorobotwórczymi bakteriami.



Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania gęstej, nadmiernie lepkiej wydzieliny oskrzelowej, np. przewlekłe zapalenie oskrzeli i jego zaostrzenia, astmatyczne zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, rozstrzenia oskrzeli, zapalenie krtani, zapalenie zatok obocznych nosa, w okresie przed i pooperacyjnym w celu uniknięcia powikłań ze strony układu oddechowego (zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ambroksol. Leku nie należy stosować przy owrzodzeniach żołądka, dwunastnicy i jelit.

Dawkowanie

Doustnie, 3 razy dziennie po 1 tabletkę. W długotrwałej terapii dawkę można zmniejszyć do 2 razy dziennie po 1 tabletkę. Lek należy przyjmować po jedzeniu, popijając niewielką ilością płynu.