



## Denicit 1,5mg tabletki x 100 szt.

Cena: 49,02 zł



### Opis słownikowy

Producent	SOLINEA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Postać

Tabletki powlekane

#### Opakowanie

100 szt.

#### Działanie

Lek **Denicit** stosowany jest w celu odzwyczajenia się od palenia tytoniu i zmniejszenia głodu nikotynowego u osób, które chcą skończyć z paleniem. Stosowanie leku **Denicit** ma na celu pomóc w całkowitym zaprzestaniu używania produktów zawierających nikotynę. **Jedno opakowanie produktu wystarczy na pełną kurację.**

#### Wskazania

Leczenie uzależnienia od nikotyny.

#### Sposób użycia

Ten lek należy zawsze stosować tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jedno opakowanie leku **Denicit** (100 tabletek powlekanych) wystarczy na pełną terapię. Czas leczenia to 25 dni. Lek **Denicit** należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym schematem.



Dni terapii	Zalecane dawkowanie
Od 1. do 3. dnia	1 tabletkę powlekaną co 2 godziny
Od 4. do 12. dnia	1 tabletkę powlekaną co 2,5 godziny
Od 13. do 16. dnia	1 tabletkę powlekaną co 3 godziny
Od 17. do 20. dnia	1 tabletkę powlekaną co 5 godzin
Od 21. do 25. dnia	1-2 tabletki powlekane na dobę

Należy zrezygnować z palenia nie później niż 5. dnia po rozpoczęciu terapii. Nie należy palić podczas trwania terapii, ponieważ może to nasilić działania niepożądane. Jeżeli rezultat terapii jest niezadowolający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy można rozpocząć ponownie.

#### Ostrzeżenie

Leku nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku przebytego niedawno zawału mięśnia sercowego,
- w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej,
- w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca,
- w przypadku niedawno przebytego udaru mózgu,
- w okresie ciąży i karmienia piersią.

#### Skład

Substancją aktywną leku jest cytyzyna. Jedna tabletkę powlekaną zawiera 1,5 mg cytyzyny. \ Pozostałe składniki to: wapnia wodorofosforan bezwodny, skrobia ziemniaczana, skrobia żelowana-kukurydziana, talk, wapnia fosforan, Opadry AMB II 88A265001 brown.