

Dextin 25mg roztwór doustny w saszetkach x 20 szt.

Cena: 7,72 zł



Opis słownikowy

Producent	SOLINEA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Roztwór

Opakowanie

20 szt.

Działanie

Dextin to lek przeciwbólowy z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Stosowany jest w celu krótkotrwałego, objawowego leczenia ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. ostrego bólu mięśni lub stawów, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. ostrego bólu w układzie mięśniowym i kostno-stawowym, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów. **Dextin** jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych.

Sposób użycia

- **Dorośli:** w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, zalecana dawka wynosi 25mg co 8 godzin. Nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 75 mg.

Stosować doustnie. Roztwór można przyjąć bezpośrednio z saszetki lub po wymieszaniu zawartości saszetki w szklance wody. Po



Otworzeniu saszetki należy spożyć całą jej zawartość.

Przeciwwskazania

apteka
w sieci

- nadwrażliwość na substancję czynną, inne leki z grupy NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
- jeśli substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego;
- reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne podczas leczenia ketoprofenem lub fibratami w wywiadzie;
- krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ w wywiadzie;
- czynna choroba wrzodowa lub krwotok z przewodu pokarmowego lub jakiegokolwiek krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja w wywiadzie;
- przewlekła niestrawność;
- występowanie innego czynnego krwawienia lub zaburzeń przebiegających z krwawieniami;
- choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego;
- ciężka niewydolność serca;
- umiarkowane lub ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny ≤ 59 mL/min);
- ciężkie zaburzenie czynności wątroby (10-15 punktów w skali Child'a-Pugh'a);
- skaza krwotoczna i inne zaburzenia krzepnięcia krwi;
- ciężkie odwodnienie (z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania niedostatecznej ilości płynów); trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią.

Skład

Każda saszetka zawiera 25 mg deksketoprofenu (w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem).

Substancje pomocnicze: sacharoza, makrogol 400, metylu parahydroksybenzoesan (E218), neohesperydyno-dihydrochalkon, amonowy glicyryzynian, sacharyna sodowa, powidon, powidon K-90, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan, aromat cytrynowy 791058 (zawiera etanol i olejek cytrynowy), woda oczyszczona.