



apteka
w sieci

Dezamigren 12,5mg tabletki x 2 szt.

Cena: 19,19 zł



Opis słownikowy

Producent	AFLOFARM
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki powlekane

Opakowanie

2 szt.

Działanie

Lek przeciwmigrenowy **Dezamigren** należy do grupy leków zwanych selektywnymi agonistami receptora serotoninowego. Zawiera substancję czynną almotryptan, który wiąże się z receptorami serotoninowymi w naczyniach krwionośnych w mózgu powodując ich zwężenie, dzięki czemu redukuje reakcję zapalną związaną z migreną.

Wskazania

Doraźne leczenie bólu głowy związanego z ostrymi napadami migreny z aurą lub bez aury.

Sposób użycia

Dezamigren może być stosowany jedynie u pacjentów z rozpoznaną migreną. **Dezamigren** należy stosować wyłącznie w celu leczenia występującego napadu migreny, a nie w celu zapobiegania napadom migreny lub bólom głowy.

› Dorośli (w wieku od 18 do 65 lat) - zalecana dawka to jedna tabletki (12,5 mg).



Lek należy przyjąć najszybciej jak to możliwe po wystąpieniu napadu migreny. Lek jest skuteczny także w przypadku przyjęcia w późniejszym stadium. Jeżeli napad migreny nie ustąpi, pacjent nie powinien przyjmować więcej niż jedną tabletkę podczas tego samego napadu.

Jeśli u pacjenta wystąpi kolejny napad migreny w ciągu 24 godzin, można przyjąć drugą tabletkę w dawce 12,5 mg pod warunkiem zachowania przynajmniej 2-godzinnej przerwy pomiędzy przyjęciem pierwszej i drugiej tabletki.

Tabletkę należy połknąć popijając płynem (np. wodą). Tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Maksymalna dawka dobową to dwie tabletki (25 mg).

Ostrzeżenia

Leku **Dezamigren** nie należy stosować:

- › jeśli pacjent ma uczulenie na almotryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- › jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek wystąpiła jakakolwiek choroba, która ogranicza dopływ krwi do serca, taka jak:
 - » zawał mięśnia sercowego,
 - » dusznica bolesna,
 - » ból lub dyskomfort w klatce piersiowej występujący zwykle po wysiłku fizycznym lub stresie,
 - » problemy z sercem bez towarzyszącego bólu,
 - » ból w klatce piersiowej występujący w trakcie spoczynku,
 - » ciężkie nadciśnienie tętnicze (bardzo wysokie ciśnienie krwi),
 - » niekontrolowane łagodne bądź umiarkowane wysokie ciśnienie krwi.
- › jeśli pacjent miał udar mózgu lub zmniejszony dopływ krwi do mózgu.
- › jeśli u pacjenta wystąpiła niedrożność w dużych naczyniach krwionośnych ramion lub nóg (choroba naczyń obwodowych).
- › jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki stosowane w leczeniu migreny zawierające ergotaminę, dihydroergotaminę czy metysergid lub inne leki z grupy agonistów serotoniny (np. sumatryptan). Patrz punkt: „Lek Dezamigren a inne leki”.
- › jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby

Skład

Substancją czynną leku jest almotryptan w dawce 12,5 mg (w postaci almotryptanu jabłczanu).

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: mannitol, celuloza mikrokryształiczna, powidon K 29/32, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), sodu stearylofumarany; otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.