



apteka  
w sieci

# Diclofenac APTEO MED 10 mg/g żel 100 g

Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.  
Ogrodowa 40, Racibórz  
+48 32 415 14 67

Cena: 9,25 zł



## Opis słownikowy

Dawka	10 mg/g
Opakowanie	100 g
Postać	żel
Producent	SYNOPTIS PHARMA
Substancja czynna	Diclofenacum natricum

## Opis produktu

### Postać

Żel

### Opakowanie

Tubka 100g

### Działanie

Lek **Diclofenac APTEO MED** zawiera substancję czynną leku - **diklofenak sodowy**, należący do grupy leków znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże leku **Diclofenac APTEO MED** wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

### Wskazania

Lek stosowany jest w miejscowym leczeniu:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat:

- pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń),
- bólu pleców,
- ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie



Dorośli (w wieku powyżej 18 lat):

- ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

### Sposób użycia

**Diclofenac APTEO MED** należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy na dobę, delikatnie wcierając. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: od 2 g do 4 g leku **Diclofenac APTEO MED** (ilość odpowiadająca wielkości owocowi wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) wystarczy do leczenia obszaru o powierzchni około 400 cm<sup>2</sup> do 800 cm<sup>2</sup>.

### Leku nie należy stosować dłużej niż:

- dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: 14 dni w przypadku urazów mięśni i stawów (skręcenia, nadwyrężenia lub stłuczenia) i zapalenia ścięgien.
- dorośli (w wieku powyżej 18 lat): 21 w przypadku bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeżeli ból i obrzęk nie ustępują w ciągu 7 dni lub nastąpi pogorszenie, należy skontaktować się z lekarzem.

### Ostrzeżenia

Leku **Diclofenac APTEO MED** nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak lub glikol propylenowy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występują objawy nadwrażliwości na lek takie jak: sapanie lub skrócenie oddechu (astma), wysypka skórna z pęcherzami lub pokrzywka, obrzęk twarzy lub język, zapalenie błony śluzowej nosa (katar),
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa (np. wysypka, trudność w oddychaniu lub napad kaszlu) po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen albo innych leków używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni,
- w trzecim trymestrze ciąży,
- u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

### Skład

1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.

Substancje pomocnicze: glikol propylenowy, sodu wodorotlenek, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, karbomer, hydroksyetyloceluloza, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), woda oczyszczona.