



Diclotica 10 mg/g żel 100 g

Cena: 15,90 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|---------------------|
| Opakowanie | 100g |
| Postać | żel |
| Producent | TACTICA |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |

Opis produktu

Postać

Żel

Opakowanie

Tubka 100g

Działanie

Lek **Diclotica** zawiera substancję czynną diklofenak sodowy, który posiada działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Wskazania

Stosowany miejscowo w leczeniu:

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat

- pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń)
- bólu pleców
- ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgna, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.



Dorośli (powyżej 18 lat)

apteka
w sieci

- ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Sposób użycia

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat - nakładać cienkie warstwy żelu na bolące miejsca, 3 do 4 razy na dobę w zależności od potrzeby 2g do 4g leku co odpowiada 2,0-2,5 cm i jest wystarczające do posmarowania powierzchni około 400cm² do 800cm².

Okres leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie. W przypadku stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, nie należy go stosować dłużej niż 14 dni w przypadku pourazowych stanów zapalnych i reumatyzmu tkanki miękkiej i nie dłużej niż 4 tygodnie w przypadku choroby zwyrodnienia stawów. Należy skonsultować się z lekarzem po 7 dniach leczenia w przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych.

Ostrzeżenia

Leku nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Nie stosować jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa (np. wysypka, trudność w oddychaniu lub napad kaszlu) po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy (stosowany również jako przeciwzakrzepowy), ibuprofen, lub innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni, gorączki i stanów zapalnych. Nie stosować w trzecim trymestrze ciąży, ani u dzieci poniżej 14 lat.

Skład

Substancja czynna - diklofenak sodowy. Jeden gram żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.

Pozostałe składniki - sodu wodorotlenek, hydroksyetyloceluloza, karbomer, glikol propylenowy, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i woda oczyszczona.