



apteka  
w sieci

## Dicopeg endo si saszetki 4 szt.



Cena: 42,52 zł

### Opis słownikowy

Producent	VITIS PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### Postać

Proszek do sporządzania roztworu do podawania doustnego

#### Opakowanie

Saszetki x 4 szt.

#### Działanie


**Dicopeg endo si** to wyrób medyczny na bazie **makrogolu 3350** i **symetykonu**. **Makrogol 3350** to obojętna substancja, która nie wchłania się, ani nie drażni błony śluzowej, nie ulega fermentacji i jest wydalana w niezmienionej postaci. **Makrogol** zatrzymuje dużą objętość płynów w przedziale jelitowym, dzięki swojemu powinowactwu do wody, nawadnia masy kałowe i pobudza perystaltykę. W skład wyrobu medycznego **Dicopeg endo si** zawiera również **symetykon**, który wykazuje działanie przeciwpięjące, dzięki czemu ułatwia eliminację gazu z przewodu pokarmowego.

#### Wskazania

Wyrób medyczny **Dicopeg endo si** usuwa stałe resztki z okrężnicy, co jest szczególnie ważne w przygotowaniu do badań endoskopowych, radiologicznych i ultrasonograficznych w celu postawienia dokładnego rozpoznania.

#### Sposób użycia

W celu całkowitego oczyszczenia jelit, co jest potrzebne do przeprowadzenia niektórych badań diagnostycznych (badania endoskopowe lub radiologiczne jelita grubego, ultrasonografia jamy brzusznej) i w innych sytuacjach klinicznych, należy postępować dokładnie według



Informacji podanych w ośrodku, w którym badanie endoskopowe jest wykonywane, co zwykle obejmuje kontrolowaną dietę w dniach poprzedzających badanie.

Należy stosować podane dawkowanie, chyba że lekarz przepisał inaczej. W celu doraźnego sporządzenia roztworu do stosowania doustnego:

1. Zawartość 2 saszetek wsypać do 1 l wody, mocno wstrząsnąć i wypić jednorodny roztwór w ciągu 1-2 godzin, przyjmując np. 250 ml roztworu co 10-15 minut;
2. Wypić dodatkowe 500 ml (pół litra) wody, do łącznej objętości 1,5 l (1 l Dicopeg endo si i 500 ml wody);
3. Po około 1 godzinie, powtórzyć przygotowanie kolejnych 2 saszetek i przyjąć drugi litr roztworu (i dodatkowe 500 ml wody), w ten sam sposób.

Po przyjęciu pierwszego litra, zacznie się perystaltyka i parcie na stolec. Wypróżnienia będą stopniowo stawać się bardziej płynne, aż do uzyskania wydalania przezroczystego płynu bez resztek kałowych. Wskazuje to na poprawne przeprowadzenie oczyszczania i na gotowość do wykonania badania.

### Ostrzeżenia

Produktu nie należy stosować Dicopeg endo si:

- w przypadku znanej nadwrażliwości na makrogol lub inne składniki,
- w przypadku perforacji, niedrożności lub zwężenia jelit, niedrożności porażennej jelit, poważnych chorób zapalnych przewodu pokarmowego, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i ostre rozdęcie okrężnicy.

Stosowanie środków przeczyszczających jest przeciwwskazane w przypadku ostrych bólów brzucha nieznanego pochodzenia, nudności i wymiotów, krwawienia z odbytu nieznanego pochodzenia oraz w przypadku silnego odwodnienia.

### Skład

Jedna saszetka zawiera: makrogol 3350 i symetykon. Substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sól sodowa sacharyny. Nie zawiera glutenu.