




Dicopeg Liquid saszetki 10 szt.



Cena: 26,85 zł

Opis słownikowy

Producent	VITIS PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Postać

Roztwór

Opakowanie

Saszetki x 10 szt.

Działanie

Roztwór doustny **Dicopeg Liquid** zawiera **makrogol** - rozpuszczalny w wodzie, obojętny polimer o wysokiej masie cząsteczkowej, wykazujący zdolności wiązania wody spożywanej wraz z preparatem, zatrzymując ją w stolcu. **Makrogol** zmiękcza i nawadnia masę kałową i ułatwia jej wydalanie. Roztwór doustny **Dicopeg Liquid** pobudza perystaltykę, przyspiesza pasaż jelitowy oraz wspomaga regularne wypróżnianie, przeciwdziałając tym samym zaparciom i tworzeniu się zbitych mas kałowych. **Makrogol** nie jest wchłaniany ani metabolizowany w przewodzie pokarmowym, a przyjmowany wraz z płynem we wskazanych dawkach nie prowadzi do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej.

Wskazania

Objawowe leczenie zaparcia.

Sposób użycia

A celu regulowania wydalania miękkiego stolca, należy zwiększać lub zmniejszać dawkę produktu, w zależności od indywidualnej odpowiedzi na leczenie. Jeśli pacjent nie zauważy poprawy po 7 dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.



Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

- od 2 do 8 saszetek dziennie

Maksymalna skuteczna dawka zwykle nie przekracza 8 saszetek dziennie. Roztwór doustny należy przyjmować w postaci, w jakiej jest zawarty w saszetce. Po zażyciu produkt należy wypić około 60ml wody na każdą saszetkę. Jeśli ma być przyjęta minimalna dawka (2 saszetki dziennie), zaleca się przyjęcie jej rano. W przypadku większych dawek, należy podzielić je na porcje przyjmowane rano i wieczorem.

Dzieci w wieku od 6. miesięcy do 12 lat:

- od 6 do 10 kg: 1 saszetka dziennie
- od 10 do 15 kg: 1-2 saszetki dziennie
- od 16 do 20 kg: 2-3 saszetki dziennie
- od 21 do 43 kg: 3-4 saszetki dziennie

Maksymalna skuteczna dawka zwykle nie przekracza 4 saszetek dziennie. Roztwór doustny należy przyjmować w postaci, w jakiej jest zawarty w saszetce. Po zażyciu produkt należy przyjmować w postaci, w jakiej jest zawarty w saszetce. Po zażyciu produktu należy wypić około 60ml wody na każdą saszetkę. Jeżeli ma być przyjęta minimalna dawka (1 saszetka dziennie), zaleca się przyjęcie jej rano. W przypadku większych dawek, należy je podzielić na porcje przyjmowane rano i wieczorem.

Ostrzeżenia

Stosowanie produktu u dzieci należy skonsultować z lekarzem. Podawanie dzieciom powinno odbywać się pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Przed zastosowaniem w czasie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. Produkt może skracać czas pasażu jelitowego i w tym samym wchłanianie leków stosowanych doustnie.

W związku z tym, wskazane jest, aby skonsultować się z lekarzem w przypadku jednoczesnego przyjmowania leków doustnych, które w każdym przypadku muszą być podawane w odstępie co najmniej 2 godzin od przyjęcia dawki Dicopeg Liquid. W przypadku działań niepożądanych należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Skład

Woda oczyszczona, makrogol, kwas cytrynowy, sorbinian potasu, benzoosan sodu, sukraloza. Nie zawiera glutenu.