

DobenoX 250mg tabletki x 30 szt.

Cena: 11,82 zł



Opis słownikowy

Producent	HASCO LEK
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki

Dawka

250mg

Opakowanie

30 szt.

Działanie

DobenoX zawiera substancję czynną - wapnia dobezylan jednowodny. Usprawnia on krążenie żyłne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Redukuje przepuszczalność ich ścian oraz nadmierną lepkość krwi i osocza, co zapobiega powstawaniu zastoju i zakrzepów w naczyniach żylnych.

Wskazania

Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (ból i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych.

Objawowe leczenie żylaków odbytu.



Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Sposób użycia

O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych zwykle stosuje się od 2 do 4 tabletek na dobę (co odpowiada dawce dobowej od 500 mg do 1000 mg substancji czynnej - dobezylanu wapnia jednowodnego):

- niewydolność żylna -zwykle 2 tabletki 1-2 razy na dobę;
- żylaki odbytu -zwykle 2 tabletki 1-2 razy na dobę.

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Należy ostrożnie stosować lek, jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka lub niewydolność nerek.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła lub krtani, ból podczas przełykania, zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okolic narządów płciowych i odbytu, ponieważ mogą to być objawy poważnej choroby - agranulocytozy.

Skład

Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny. 1 tabletkę zawiera odpowiednio 250 mg albo 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokryształiczna, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka Opadry II 57U18539 White o składzie: hypromeloza, polidekstroza, tytanu dwutlenek(E 171), talk, maltodekstryna, średniołańcuchowe trójglicerydy.