



apteka
w sieci

Dulcobis 10 mg czopki przeczyszczające 10 szt.



Cena: 24,94 zł

Opis słownikowy

Dawka	10 mg
Opakowanie	10 czop.
Postać	czopki
Producent	OPELLA HEALTHCARE POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Bisacodylum

Opis produktu

Postać

Czopki

Opakowanie

10 szt.

Działanie

Miejscowo działający lek przeczyszczający powodujący pobudzenie wypróżnienia i rozmiękczenia stolca. Jako lek przeczyszczający działający na jelito grube, **Dulcobis** pobudza naturalny proces wypróżnienia w dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Tym samym **Dulcobis** nie wpływa na zmianę trawienia lub wchłaniania kalorii i składników odżywczych w jelicie cienkim.

Wskazania

Lek stosuje się:

- u dorosłych, młodzieży i dzieci w krótkotrwałym, objawowym leczeniu zaparc
- u dorosłych w celu przygotowania do badań, przed operacjami i po operacjach oraz w stanach wymagających ułatwienie wypróżnienia.

Sposób użycia

Lek przeznaczony do krótkotrwałego stosowania. Okres stosowania leku Dulcobis, bez konsultacji z lekarzem, nie powinien przekraczać



5 dni. Działanie czopka występuje średnio po 20 minut (10-45 minut po podaniu).

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się następujące dawkowanie:

Krótkotrwałe leczenie zaparc:

Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 10 lat: 1 czopek (10mg) na dobę nie dłużej niż 5 dni. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej. Leku nie stosować u dzieci poniżej 10 lat.

Przygotowanie do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych u dorosłych:

Podczas przygotowania do badań lub przed zabiegami operacyjnymi lek Dulcobis powinien być stosowany pod nadzorem personelu medycznego.

Dorośli:

W celu całkowitego opróżnienia jelit osoby dorosłe powinny początkowo przyjąć lek Dulcobis w innej postaci, (Dulcobis, 5mg tabletki dojelitowe): 2-4 tabletki wieczorem w dniu poprzedzającym badanie. Następnego dnia rano zalecane jest zastosowanie doodbytniczego produktu leczniczego Dulcobis w postaci czopka 10mg.

Sposób stosowania

Rozpakować czopek, a następnie umieścić w odbycie stożkowatym końcem do przodu.

Ostrzeżenia

Leku nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na bisakodyl lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit,
- jeśli u pacjenta występują ostre zapalenie wyrostka robaczkowego lub ostre zapalne choroby jelit,
- jeśli pacjent utracił dużo wody, lub istnieją u niego możliwości zaburzenia równowagi elektrolitowej z innych przyczyn,
- jeśli pacjent odczuwa silny ból brzucha połączony z nudnościami i wymiotami - może to wskazywać na poważniejsze schorzenia,
- u dzieci poniżej 10 lat

Skład

Substancją czynną leku jest bisokodyl. Jeden czopek zawiera 10 miligramów bisakodylu. Pozostałe składniki: tłuszcz stały (Witepsol W 45)