


Dynid Gem 5 mg tabletki x 10 szt.-data ważności 06.2024

Cena: 3,99 zł



Opis słownikowy

Producent	GLENMARK
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki

Opakowanie

10 szt.

Skład

Substancją czynną leku jest desloratadyna. Każda tabletki zawiera 5mg desloratadyny.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokryształiczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Działanie

Lek przeciwalergiczny **Dynid Gen** ułatwia kontrolę alergicznej oraz jej objawów, nie wywołując senności. **Dynid Gen** łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, np. katarzem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych i młodzieży 12 lat i więcej.

Lek **Dynid Gen** może być również stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów należą: świąd skóry i pokrzywka.

Złagodzenie tych objawów utrzymuje się przez cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz normalnego



Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywka.

Sposób użycia

- **Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej:** zalecana dawka to jedna tabletkę raz na dobę popijana wodą, przyjmowana w trakcie posiłku lub bez posiłku.

Ten lek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletkę należy połknąć całość.

Lekarz prowadzący określi czas trwania leczenia lekiem **Dynid Gem** po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta. Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, lekarz prowadzący zaleci schemat leczenia, biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg choroby.

Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, lekarz może zalecić dłuższe stosowanie leku.

W pokrzywce czas trwania leczenia może różnić się u poszczególnych pacjentów i dlatego pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Ostrzeżenia

Nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników. Przed rozpoczęciem stosowania leku **Dynid Gem** należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
- jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym

Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.