



# Echinasal Syrop 125g



Cena: 15,61 zł

## Opis słownikowy

Producent	HERBAPOL WROCLAW
Rejestracja	Lek ziołowy

## Opis produktu

### Producent:

HERBAPOL WROCLAW

### Postać leku:

Syrop

### Opakowanie:

Butelka 125 g

### Skład:

Extractum compositum (1: 4,4) ex : Plantaginis lanceolatae folio (3 cz.), Grindeliae herba (1 cz.), Rosae fructu (1 cz.) 5 g, Thymi herbae extractum (1:4) 3 g, gliceryna, woda amoniakalna 25%, Echinaceae purpureae herbae succus (1:1) 2 g oraz substancje pomocnicze: Sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat z porzeczki

### Działanie:

Syrop Echinasal jest preparatem roślinnym zawierającym w swoim składzie wyciąg złożony z liścia babki lancetowatej, ziela grindelii i owoców róży, wyciąg z ziela tymianku i sok z ziela jeżówki purpurowej. Jest stosowany tradycyjnie jako środek pobudzający odporność organizmu.

### Wskazania:



Tradycyjnie stosowanym środkiem profilaktycznym w okresach zmniejszonej odporności. Pomocniczo - w łagodnych stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z objawami kaszlu (np. w przebiegu przeziębienia).

**Przeciwwskazania:**

Gruźlica, postępujące choroby układowe, białaczki, kolagenozy, stwardnienie rozsiane i choroby autoimmunologiczne, AIDS lub zakażenie HIV, uczulenie na kwiaty koszydkowe z rodziny Asteraceae, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów przed użyciem leku, powinni skontaktować się z lekarzem.

**Dawkowanie:**

Dzieci od 7 do 12 lat - 2 razy dziennie po 1 łyżce stołowej, dzieci powyżej 12 lat i dorośli - 3 do 4 razy dziennie po 1 łyżce stołowej. Dzieci poniżej 7 lat - wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Stosować nie dłużej niż 10 dni, jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy zasięgnąć opinii lekarza. W zastosowaniu profilaktycznym (np. w okresach występowania wzmożonych infekcji dróg oddechowych), należy stosować połowę dawek leczniczych. Dzieci od 7 do 12 lat - 1 raz dziennie po 1 łyżce stołowej, dzieci powyżej 12 lat i dorośli - 2 razy dziennie po 1 łyżce stołowej. Dzieci poniżej 7 lat - wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Stosowanie profilaktyczne preparatu wymaga wielodniowego podawania, jednak nie dłużej niż 20 dni.