



EFFAKTAN MAX 50mg/5ml roztwór doustny, saszetki 5 szt.



Cena: 12,69 zł

Opis słownikowy

Dawka	50 mg/5ml
Opakowanie	5 szt.
Postać	roztwór doustny
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Dimenhydrinatum

Opis produktu

Postać

Roztwór doustny

Opakowanie

Saszetki 5 szt.

Działanie

Lek **Efaktan Max** zawiera substancję czynną dimenhydraminę (dimenhydrinat) o działaniu przeciwwymiotnym, przeciwuczuleniowym i łagodnie uspokajającym. Początek działania występuje po 30 minutach. Efekty lecznicze obserwowane są przez 3 do 6 godzin po podaniu leku.

Wskazania

Zapobieganie chorobie lokomocyjnej oraz zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów innego pochodzenia (z wyjątkiem wymiotów wywołanych przez leki stosowane w chemioterapii nowotworów).

Sposób użycia

Lek **Efaktan Max** należy stosować doustnie.

Zalecaną dawkę należy przyjąć przynajmniej 30 minut przed planowaną podróżą lub zastosowaniem źle tolerowanego leku.



Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat:

Zalecana dawka to 50 mg do 100 mg (1-2 saszetki). W razie konieczności można ją powtarzać co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobową nie powinna przekroczyć 400 mg (nie więcej niż 8 saszetek na dobę).

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat:

Zalecana dawka to od 25 do 50 mg (maksymalnie 1 saszetka leku Efaktan Max 50 mg/5ml). W przypadku dawki 25 mg należy podawać lek o mniejszej mocy Efaktan, 25 mg/5ml.

W razie konieczności można ją powtarzać co 6 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobową u dzieci nie powinna przekroczyć 5 mg/kg masy ciała, przy czym nie więcej niż 150 mg na dobę (nie więcej niż 3 saszetki na dobę).

Ze względu na wielkość dawki (moc), lek Efaktan Max 50 mg/5ml, nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zawartość jednej saszetki należy bezpośrednio spożyć.

Ostrzeżenia

Leku **Efaktan Max** nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, leki przeciwhistaminowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

Leku **Efaktan Max** nie należy stosować jeśli u pacjenta występują:

- ostry napad astmy,
- guz chromochłonny,
- jaskra z wąskim kątem przesączania,
- porfiria,
- przerost gruczołu krokowego oraz zaleganie moczu w pęcherzu,
- padaczka

Skład

Substancją czynną leku jest dimenhydramina. Pozostałe składniki to sacharoza, sacharyna sodowa (E 954), glikol propylenowy, aromat czarnej porzeczki (glikol propylenowy, kwas mlekowy, 4-4-hydroksyfenilo)-2-butanon, kwas masłowy, domaskon beta, furaneol), woda oczyszczona.