



Efferalgan Forte 1g tabletki musujące x 8 szt.

Cena: 8,53 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|---------------------|
| Producent | UPSA |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |

Opis produktu

Postać

Tabletki musujące

Dawka

1 g

Opakowanie

8 szt.

Działanie


Efferalgan Forte to lek w postaci musujących tabletek, wykazujący działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowym. Zawiera substancję czynną paracetamol, cechujący się dobrym profilem bezpieczeństwa wśród substancji przeciwbólowych i przeciwgorączkowym. Musująca postać preparatu sprawia, że **Efferalgan Forte** zaczyna działać 2 razy szybciej od leku w postaci zwyczajnej tabletki.

Wskazania

Ból różnego pochodzenia (ból głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne), gorączka.

Sposób użycia

Dawkę ustala się na podstawie masy ciała. U osób dorosłych nie stosować bez zalecenia lekarza dłużej niż 5 dni, gorączka 3 dni, u



młodzięzy nie dłużej niż 3 dni.

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg (w wieku powyżej 15 lat): zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 do 15 mg/kg masy ciała co 4 do 6 godzin: 1 tabletkę do 3 razy/dobę, w sumie nie więcej niż 3 g paracetamolu. W przypadku nasilonego bólu dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej 75 mg/kg masy ciała (4 g paracetamolu), czyli 4 tabletek/dobę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, chlorowodorek propacetamolu lub którąkolwiek substancję pomocniczą; osoby o masie ciała poniżej 50 kg; 1-szy trymestr ciąży; ciężka niewydolność wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby; niedobór dehydrogenazy-glukozy-6-fosforanowej; leczenie inhibitorami MAO oraz okres do 14 dni po zakończeniu leczenia, jednoczesne stosowanie leków przeciwbólowych o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 15 lat. Zawiera paracetamol, aby uniknąć przedawkowania należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Nie stosować dawek większych niż zalecane (ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby). Poinformować pacjentów o objawach ciężkich reakcji skórnych i zaprzestać stosowania w przypadku wystąpienia wysypki skórnej lub innego objawu nadwrażliwości. Podczas leczenia nie spożywać alkoholu i nie zażywać leków zawierających alkohol (ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby).

Ostrożnie stosować u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i kontrolujących zawartość sodu w diecie. Nie stosować przy dziedzicznej nietolerancji fruktozy. Zachować ostrożność przy stosowaniu w: zaburzeniach czynności wątroby (zespół Gilberta), nerek, chorobie alkoholowej, anoreksji, bulimii lub kacheksji, długotrwałym niedożywieniu, odwodnieniu, hipowolemii, u pacjentów z małymi rezerwami glutationu w wątrobie (z zaburzeniami łąknienia, mukowiscydozą, zakażonych wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych, z posocznicą).

Skład

Jedna tabletkę musująca zawiera 1 g paracetamolu.