



apteka  
w sieci

## Elmetacin 10 mg/g (1%) aerozol 50ml



Cena: 30,48 zł

### Opis słownikowy

Producent	STADA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Postać

Roztwór

#### Opakowanie

50 ml

#### Działanie


Lek w aerozolu do stosowania zewnętrznego **ELMETACIN 10 mg/g** zawiera składnik indometacynę, która wykazuje właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne.

#### Wskazania

Objawowe, miejscowe leczenie bólu wywołanego:

- przez stany zapalne powstałe w wyniku ostrych kontuzji, urazów (skręcenia, stłuczeń, zwichnięcia),
- zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów,
- stanem zapalnym tkanek miękkich np. zapalenie ścięgien i pochewek ścięgnistych, torebek stawowych, zeszywniałego stawu barkowego.

#### Sposób użycia



Lek **Elmetacin** należy nakładać 3 do 5 razy na dobę. W zależności od wielkości bolesnego obszaru, należy nałożyć 0,5ml do 1,5ml aerozolu leku np. należy nacisnąć na pompkę 5 do 15 razy (4 mg do 12 mg indometacyny).

Lek powinien być rozpylony na miejsce zmienione chorobowo tak, aby całkowicie je przykryć. Całkowita dawka dobową nie powinna przekraczać 7,5ml roztworu leku **Elmetacin** (co odpowiada 60 mg indometacyny i 75 naciśnięciom aplikatora).

### Ostrzeżenia

Leku nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje astma, podrażnienie skóry, lub występowały objawy alergiczne po zastosowaniu innych leków przeciwbólowych lub przeciwreumatycznych (niesteroidowe leki przeciwzapalne), jak np. kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna),
- na otwarte rany, skórę zmienioną zapalnie lub zakażoną, wypryski (egzema), błony śluzowe lub do oczu
- podczas ostatniego, trzeciego trymestru ciąży,
- jako środek ostrożności, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub jelit, chyba że lekarze zaleci inaczej,
- u dzieci i młodzieży, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej.

### Skład

Substancją czynną leku jest indometacyna. 1 g roztworu zawiera 10 mg indometacyny. Pozostałe składniki to - alkohol izopropylowy, izopropylu mirystynian.