



apteka
w sieci

Eloprine Forte 1000mg tabletki 30 szt.

Cena: 20,81 zł



Opis słownikowy

Dawka	1000 mg
Opakowanie	30 szt.
Postać	tabletki
Producent	POLFARMEX
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Inosinum pranobexum

Opis produktu

Postać

Tabletki

Dawka

1000 mg

Opakowanie

50 szt.

Działanie

Lek **Eloprine Forte** zawiera substancję czynną - inozyzy pranobeks, hamującą in vitro namnażanie się chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy *Herpes*.

Wskazania

Lek **Eloprine Forte** wskazany jest dla osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych oraz w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (*Herpes simplex*).

Sposób użycia

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie



wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

apteka
w sieci

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zalecana dawka to 50mg na kg masy ciała na dobę. Zazwyczaj dawka wynosi 3 tabletki (3g) na dobę (czyli 1 tabletka 3 razy na dobę. Nie należy przyjmować więcej, niż 4 tabletki na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku

Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych. Dla dzieci, które nie umieją połknąć tabletek, zaleca się podawanie leku Eloprine Forte w syropie.

Sposób podawania

Lek należy stosować doustnie. Tabletkę należy popić dużą ilością płynu, najlepiej wodą. W razie trudności z połknięciem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletkę można pokruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

Czas trwania leczenia

Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni. Zaleca się, aby po ustąpieniu objawów choroby przyjmować lek jeszcze przez 1 do 2 dni.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.

Inozyny pranobeksu nie należy stosować u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Skład

Lek **Eloprine Forte** zawiera substancję czynną inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoosan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3). Jedna tabletka zawiera 1000mg inozyny pranobeksu.

Pozostałe składniki to: mannitol, skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.