



apteka
w sieci

Eloprine syrop 0,25 g/5ml 150ml

Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

Cena: 11,56 zł



Opis słownikowy

Producent	POLFARMEX
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Syrop

Opakowanie

Butelka 150ml

Dawka

0,25 g/5ml

Skład

5ml syropu (1 miarka) zawiera 250mg substancję czynną: inozyny pranobeksu oraz substancje pomocnicze. 1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu. 5 ml syropu (1 miarka) zawiera 250 mg inozyny pranobeksu.

Działanie

Lek wykazuje działanie przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego. Polecany w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych, infekcji i częstych przeziębień. Substancją czynną leku jest inozyna pranobeks składnik przeciwwirusowy.

Wskazania



Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych.

Sposób użycia

Doustnie: Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65. roku życia): zalecana dawka dobową wynosi 50mg/kg masy ciała na dobę (1ml na 1kg masy ciała na dobę), zwykle 3g (czyli 60ml syropu) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielnych. Dawka maksymalna wynosi 4g inozyny pranobeksu na dobę (czyli 80ml syropu na dobę);

Dzieci w wieku powyżej 1. roku życia: zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50mg/kg masy ciała na dobę (1ml syropu na 1kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby. Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 do 2 dni.

Dawkowanie według wagi: Dla osób ważących: 10-14kg: zaleca się podawać 5ml syropu 3 razy na dobę; 15-20kg: zaleca się podawać 5-7,5ml syropu 3 razy na dobę; 21-30kg: zaleca się podawać 7,5-10ml syropu 3 razy na dobę; 31-40kg: zaleca się podawać 10-15ml syropu 3 razy na dobę; 41-50kg: zaleca się podawać 15-17,5ml syropu 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1 roku życia. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Jeśli pacjent ma aktualny napad dny moczanowej.