



# Envil kaszel junior (Ambroxol) syrop 100ml

Cena: 6,71 zł



## Opis słownikowy

Producent	AFLOFARM
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać leku:

Syrop o smaku tutti-frutti

### Dawka:

15 mg/5 ml

### Opakowanie:

Butelka 100 ml

### Skład:

Ambroksolu chlorowoderek 15 mg oraz substancje pomocnicze: hydroksyetyloceluloza, sorbitol ciekły, niekryształizujący, glicerol, glikol propylenowy, sacharyna sodowa, kwas benzoesowy, aromat tutti-frutti, woda oczyszczona

### Działanie:

Envil Kaszel Junior jest lekiem w postaci syropu o działaniu wykrztuśnym i mukolitycznym (rozrzedzającym wydzielinę dróg oddechowych).

### Wskazania:

Wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych, przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej



wydzieliny oskrzelowej (np.: rozedma płuc, astma oskrzelowa, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, zapalenie oskrzeli, zapalenie krtani).  
Może być stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub pozostałe składniki produktu leczniczego.

**Dawkowanie:**

Dzieci w wieku do 2 lat - 7,5 mg (2,5 ml syropu) dwa razy na dobę; dzieci w wieku od 3 do 5 lat - 7,5 mg (2,5 ml syropu) trzy razy na dobę; dzieci w wieku od 6 do 12 lat -15 mg (5 ml syropu) dwa do trzech razy na dobę. Zalecane dawki podaje się po posiłku porannym i popołudniowym. Nie stosować przed snem. Podane dawki stosuje się w leczeniu stanów ostrych i w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w leczeniu długotrwałym (powyżej 14 dni) można je zmniejszyć do połowy.

**Działania niepożądane:**

Zaburzenia żołądka i jelit: zgaga, niestrawność, nudności, wymioty, biegunka i zaparcia. Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje alergiczne (zmiany skórne, pokrzywka, obrzęk naczyniowy, wstrząs anafilaktyczny, gorączka, duszność, dreszcze, obrzęk twarzy, ból głowy), kserostomia (suchość błony śluzowej jamy ustnej). Zaburzenia nerek i dróg moczowych: rzadko może wystąpić dyzuria (utrudnione oddawanie moczu). U niektórych osób w czasie stosowania leku Envil kaszel junior mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.