

# Espumisan krople doustne 0,04g/1ml 30ml

Cena: 22,17 zł



[www.aptekawsieci.pl](http://www.aptekawsieci.pl)

## Opis słownikowy

Producent	BERLIN CHEMIE
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Producent:

INPHARM/BERLIN-CHEMIE

### Postać leku:

Krople

### Dawka:

40 mg/ml

### Opakowanie:

Buteleczka 30 ml

### Skład:

Symetykon 40 mg oraz substancje pomocnicze: hydroksypropyloceluloza, kwas sorbowy, cyklaminian sodu, sól sodowa sacharyny, aromat bananowy, woda oczyszczona

### Działanie:

Substancją czynną w leku Espumisan jest symetykon - powierzchniowo czynny polidimetylosiloksan. Jego działanie polega na zmniejszeniu napięcia powierzchniowego pęcherzyków gazu, zawartych w pokarmie i błonie śluzowej przewodu pokarmowego, co



apteka  
w sieci

prowadzi do rozpadu tych pechezyków. Uwolnione na tej drodze gazy mogą być wchłanianie przez ściany jelit bądź usuwane w wyniku ruchów perystaltycznych. Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym i jest wydalany w postaci niezmienionej.

#### **Wskazania:**

W leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, takich jak, np.: wzdęcia i kolka niemowlęca. Wspomagająco w niemowlęcych kolkach jelitowych u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia. Wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastrokopii. Jako środek zmniejszający pienienie treści przewodu pokarmowego w zatruciach środkami powierzchniowo-czynnymi (detergentami).

#### **Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na substancję czynną - symetykon lub na którąkolwiek z pozostałych substancji pomocniczych leku. U niemowląt w 1 miesiącu życia.

#### **Dawkowanie:**

Przed użyciem wstrząsnąć. Espumisan krople może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności, również przed snem.

- Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia: 1 ml-2 ml (20-40 kropel), co odpowiada 40 - 80 mg symetykonu, na dobę w 2 (2 razy na dobę po 10 - 20 kropel) do 4 (4 razy na dobę po 5 - 10 kropel) dawkach podzielonych; całkowita dawka dobową nie większą niż 80 mg. Lek Espumisan krople należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na łyżeczce przed lub po karmieniu piersią.
- Dzieci od 1 do 6 lat: 1 ml (20 kropel), co odpowiada 40 mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.
- Dzieci od 6 do 14 lat: 1 ml-2 ml (20 - 40 kropel), co odpowiada 40 - 80 mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.
- Młodzież i dorośli: 2 ml (40 kropel), co odpowiada 80 mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.