



Esseliv Forte kapsułki 50 szt.

Cena: 17,65 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	50 szt.
Postać	kapsułki
Producent	AFLOFARM
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać leku:

Kapsułki twarde

Dawka:

300 mg

Opakowanie:

50 kapsułek

Skład:

Fosfolipidy z nasion soi zawierające polinylofosfatydylocholinę 300 mg oraz substancje pomocnicze: olej sojowy, utwardzony tłuszcz, wanilina, indygotyna, tlenek żelaza czerwony, dwutlenek tytanu, tlenek żelaza żółty

Działanie:

Fosfolipidy sojowe będące estrami kwasu cholinofosforowego i nienasyconych kwasów tłuszczowych: linowego, linolenowego i oleinowego wywierają działanie ochronne i regeneracyjne na komórki wątroby (hepatocyty). Dostarczone do ustroju wbudowują się w błony komórkowe i cytoplazmatyczne komórek wątroby uszkodzonych przez czynniki wątrobotoksyczne (niektóre leki, alkohol, rozpuszczalniki organiczne, toksyny drobnoustrojów, czynniki immunologiczne i alergiczne) przywracając ich prawidłowe funkcjonowanie. W wyniku tego poprawie ulega działanie receptorów błonowych, błonowych układów enzymatycznych oraz procesy transportu czynnego i biernego. Podawanie fosfolipidów ogranicza rozwój zwłóknienia wątroby oraz zmniejsza one ilość wolnych



rodników w wątrobie narażonej na działanie czynników toksycznych. Podawanie fosfolipidów wpływa korzystnie na gospodarkę tłuszczową ustroju - obniża poziom cholesterolu i lipoprotein w osoczu krwi. Fosfolipidy są wydzielane z żółcią. **Esseliv Forte** działa na czynną część wątroby.

Wskazania:

Ostre i przewlekłe choroby wątroby, w tym: toksyczne i polekowe uszkodzenia wątroby, poalkoholowe uszkodzenia wątroby, przewlekłe zapalenie wątroby. Wspomaganie leczenia zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki esseliv forte.

Ostrzeżenia:

Esseliv Forte nie jest skuteczny w przypadku nieodwracalnych zmian w wątrobie (marskość, wirusowe zapalenie wątroby). Okres ciąży i karmienia piersią Stosowanie leku u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią wymaga konsultacji lekarskiej.

Dawkowanie:

Dorośli 3 razy na dobę po 2 tabletki, po 2-3 miesiącach stosować dawkę podtrzymującą 3 razy na dobę po 1 kapsułce.