




apteka
w sieci

Femannose N saszetki 30 szt.

Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

Cena: 93,20 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	30 saszetek
Postać	proszek
Producent	SIIT
Rejestracja	

Opis produktu

Postać

Proszek

Opakowanie

30 saszetek

Działanie

Femannose N to wyrób medyczny wskazany w profilaktyce i leczeniu wspomagającym w profilaktyce i leczeniu wspomagającym zapalenia pęcherza moczowego (cystitis) oraz innych bakteryjnych zakażeń układu moczowego (ZUM). D-mannoza może łagodzić najczęściej występujące objawy infekcji dolnych dróg moczowych (np. pieczenie podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu, częste oddawanie moczu, parcie na pęcherz moczowy, w przypadku gdy przyczyną zakażenia jest bakteria *Escherichia coli*).

D-mannoza jest epimerem glukozy, który skutecznie zapobiega przyleganiu patogenów do nabłonka dróg moczowych. Co za tym idzie - może powstrzymać przywieranie mikroorganizmów, które już wniknęły do układu moczowo-płciowego. Dzięki temu następuje zmniejszenie wirulencji lub też przyczepialności do tkanki dróg moczowych, co pomaga w sposób "mechaniczny" zapobiega nawrotom zakażenia.

Wskazania

Profilaktyka i wspomaganie leczenia zapalenia pęcherza moczowego oraz innych bakteryjnych zakażeń układu moczowego.

Sposób użycia



Dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 14 lat.

apteka
w sieci

W leczeniu wspomagającym ostrego zapalenia pęcherza moczowego (cystis) zaleca się następujące dawkowanie:

Dzień

Od 1. do 3. dnia

4. i 5. dzień

Przyjmowanie pojedynczych saszetek należy rozdzielić w ciągu dnia.

Zalecana dawka w profilaktyce zapalenia pęcherza moczowego (cystis) to 1 saszетка dziennie.

Należy rozpuścić zawartość saszетки w szklance wody. Zaleca się picie co najmniej dwóch litrów wody dziennie, aby zwiększyć ilość oddawanego moczu. Aby zapobiec nawrotowi infekcji, należy kontynuować stosowanie przez jeden miesiąc.

Ostrzeżenia

Femannose N należy stosować tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. **Femannose N** nie zastępuje antybiotykoterapii zakażeń układu moczowego. Nie należy stosować **Femannose N** w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości lub nietolerancji na którykolwiek ze składników.

W okresie ciąży i karmienia piersią zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Produktu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 14 lat. Zalecana dawka nie może zostać przekroczona.

Jeżeli po upływie trzech dni nie nastąpiła wyraźna poprawa, należy przerwać przyjmowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy przyjmować **Femannose N** dłużej niż 30 dni. Jeśli objawy się utrzymują, skonsultować się z lekarzem. Każda saszетка przeznaczona jest do jednorazowego zastosowania i należy ją otworzyć bezpośrednio przed użyciem.

Skład

Każda saszетка zawiera: 2g D-mannozy

Substancje pomocnicze: substancje słodzące: fruktoza, sukraloza; kwas cytrynowy; barwnik: korzeń buraka; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; aromat.