



apteka
w sieci

Feminum nawilżający żel intymny 50 g

Cena: 16,22 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	50 g
Postać	żel
Producent	MASTERS PHARM
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Postać

Żel

Opakowanie

Tubka 50g

Działanie

Żel **Feminum** wykazuje działanie nawilżające i poślizgowe, dzięki którym pomaga łagodzić dolegliwości związane z suchością pochwy oraz przywraca naturalne, kwaśne pH. Preparat poprawia elastyczność miejsc intymnych, dzięki czemu zwiększa ich odporność na otarcia i zadrapania, które mogą często prowadzić do infekcji pochwy i zewnętrznych narządów płciowych.


Żel **Feminum** niweluje niedobory wydzielania śluzu w pochwie, ułatwiając stosunki płciowe (również z użyciem prezerwatywy), prowadzenie badań ginekologicznych, ultrasonograficznych, aplikację tabletek dopochwowych, tamponów czy pomiar temperatury.

Formuła żelu **Feminum** jest obojętna dla skóry, przez co jego długotrwałe stosowanie nie zaburza równowagi hormonalnej organizmu. **Feminum** to produkt naturalny, nie pozostawia plam na bieliznie.

Wskazania

Niedobór wydzielania śluzu w pochwie prowadzący do suchości.

Sposób użycia



Przed użyciem żelu należy umyć ręce. Niewielką ilość preparatu (w zależności od potrzeb) należy nałożyć na miejsca narażone na otarcia - również przed kontaktem intymnym lub badaniem. W razie potrzeby można użyć większej ilości żelu. Po użyciu żelu szczelnie zamknąć tubkę i ponownie umyć ręce.

Feminum może być aplikowany bezpośrednio na prezerwatywę, w przeciwieństwie do innych preparatów opartych na bazie oleju.

Uwagi

Feminum nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Zaleca się ograniczyć stosowanie preparatu podczas podejmowania prób poczęcia. Ze względów higienicznych to samo opakowanie wyrobu nie powinno być stosowane jednocześnie przez inne osoby. Żel **Feminum** jest wyrobem niesterylnym.

Ostrzeżenia

Stosowanie żelu należy przerwać w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

W przypadku aplikacji żelu na uszkodzoną skórę lub błony śluzowe mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, takie jak pieczenie, podrażnienia. Działanie to ustępuje zazwyczaj samoistnie po wygojeniu rany. W przypadku utrzymywania się tego rodzaju dolegliwości może zaistnieć konieczność odstawienia wyrobu. Unikać kontaktu z oczami ze względu na możliwość podrażnienia.

Przechowywanie

Preparat przechowywać w szczelnie zamkniętej tubce, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Skład

Gliceryna, Hydroksyetyloceluloza, Kwas mlekowy, Hydroksybenzoesan Metylu, Hydroksybenzoesan Propylu, Woda Oczyszczona.