

# Fervex granulat o smaku cytrynowym, saszetki x 12 szt.



Cena: 28,02 zł

## Opis słownikowy

Producent	UPSA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Granulat

### Opakowanie

Saszetki x 12 szt.

### Działanie


Fervex to preparat zwalczający objawy przeziębienia i grypy. W swoim składzie zawiera:

- **Paracetamol** - działa przeciwbólowo oraz przeciwgorączkowo.
- **Meleńnian feniramin** - zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych (dzięki temu udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu)
- **Kwas askorbinowy** - uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.

### Wskazania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat.

### Dawkowanie



Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę. Należy zachować odstęp między kolejnymi dawkami (co najmniej 4 godziny). Jeżeli pacjent posiada zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować co najmniej 8 godzinne przerwy pomiędzy dawkami.

### Sposób użycia

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 5 dni. W leczeniu stanów grypopodobnych lepiej jest przyjmować lek rozpuszczony w gorącej wodzie, na wieczór, jak najszybciej od wystąpienia objawów.

### Przeciwwskazania

Preparatu nie należy stosować, jeśli pacjent posiada nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie zażywać preparatu posiadając ciężką niewydolność wątroby lub nerek, jaskrę z wąskim kątem, rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu. Nie należy podawać dzieciom poniżej 15 lat, pacjentom z nietolerancją fruktozy, pacjentom posiadającym zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy (Fervex zawiera sacharozę).

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Istnieje ryzyko wystąpienia uzależnienia psychicznego przy stosowaniu dawek większych niż zalecane i przy długotrwałym leczeniu. By uniknąć przedawkowania, należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu (u osób dorosłych o masie ciała powyżej 50 kg, całkowita dawka dobową paracetamolu nie może być większa niż 4 g/ dobę).

Picie napojów alkoholowych lub przyjmowanie środków uspokajających (zwłaszcza barbituranów) nasila działanie uspokajające leków przeciwhistaminowych, dlatego należy unikać jednoczesnego ich przyjmowania. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (G-6-PD). Może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

### Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminu 25 mg. Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, guma arabska, sacharyna sodowa, aromat cytrynowo-rumowy.

Skład aromatu cytrynowo-rumowego: maltodekstryna, guma arabska, dekstroza, dwutlenek krzemu (E551), butylohydroksyanizol (E320), syrop cukrowy, etanol, potas, sód, balsam peruwiański- pinen,  $\beta$ -pinen, limonen,  $\gamma$ -terpinen, linalol, neral,  $\alpha$ -terpineol, geraniol.