



Fervex granulat o smaku cytrynowym, saszetki x 8 szt.



Cena: 17,98 zł

Opis słownikowy

Producent	UPSA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Granulat

Opakowanie

Saszetki x 8 szt.

Działanie


Fervex to preparat zwalczający objawy przeziębienia i grypy. W swoim składzie zawiera:

- **Paracetamol** - działa przeciwbólowo oraz przeciwgorączkowo.
- **Meleńnian feniramin** - zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych (dzięki temu udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu)
- **Kwas askorbinowy** - uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.

Wskazania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat.

Dawkowanie



Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę. Należy zachować odstęp między kolejnymi dawkami (co najmniej 4 godziny). Jeżeli pacjent posiada zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować co najmniej 8 godzinne przerwy pomiędzy dawkami.

Sposób użycia

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 5 dni. W leczeniu stanów grypopodobnych lepiej jest przyjmować lek rozpuszczony w gorącej wodzie, na wieczór, jak najszybciej od wystąpienia objawów.

Przeciwwskazania

Preparatu nie należy stosować, jeśli pacjent posiada nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie zażywać preparatu posiadając ciężką niewydolność wątroby lub nerek, jaskrę z wąskim kątem, rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu. Nie należy podawać dzieciom poniżej 15 lat, pacjentom z nietolerancją fruktozy, pacjentom posiadającym zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy (Fervex zawiera sacharozę).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Istnieje ryzyko wystąpienia uzależnienia psychicznego przy stosowaniu dawek większych niż zalecane i przy długotrwałym leczeniu. By uniknąć przedawkowania, należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu (u osób dorosłych o masie ciała powyżej 50 kg, całkowita dawka dobową paracetamolu nie może być większa niż 4 g/ dobę).

Picie napojów alkoholowych lub przyjmowanie środków uspokajających (zwłaszcza barbituranów) nasila działanie uspokajające leków przeciwhistaminowych, dlatego należy unikać jednoczesnego ich przyjmowania. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (G-6-PD). Może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminu 25 mg. Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, guma arabska, sacharyna sodowa, aromat cytrynowo-rumowy.

Skład aromatu cytrynowo-rumowego: maltodekstryna, guma arabska, dekstroza, dwutlenek krzemu (E551), butylohydroksyanizol (E320), syrop cukrowy, etanol, potas, sód, balsam peruwiański- pinen, β -pinen, limonen, γ -terpinen, linalol, neral, α -terpineol, geraniol.