

Fervex granulat o smaku malinowym, saszetki x 12 szt.



Cena: 28,05 zł

Opis słownikowy

Producent	UPSA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Granulat

Opakowanie

Saszetki x 12 szt.

Działanie


Fervex to preparat zwalczający objawy przeziębienia i grypy. W swoim składzie zawiera:

- **Paracetamol** - działa przeciwbólowo oraz przeciwgorączkowo.
- **Meleńnian feniramin** - zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych (dzięki temu udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu)
- **Kwas askorbinowy** - uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.

Wskazania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat.

Dawkowanie



Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę. Należy zachować odstęp między kolejnymi dawkami (co najmniej 4 godziny). Jeżeli pacjent posiada zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować co najmniej 8 godzinne przerwy pomiędzy dawkami.

Sposób użycia

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 5 dni. W leczeniu stanów grypopodobnych lepiej jest przyjmować lek rozpuszczony w gorącej wodzie, na wieczór, jak najszybciej od wystąpienia objawów.

Wskazania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancje pomocniczą; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; jaskra z wąskim kątem; rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu; dzieci poniżej 15 lat, nietolerancja fruktozy, zespół złęgo wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy (zawiera sacharozę).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ryzyko wystąpienia uzależnienia, głównie psychicznego, obserwowane jest głównie w przypadku stosowania dawek większych niż zalecane oraz w przypadku długotrwałego leczenia. Aby uniknąć ryzyka przedawkowania, należy poinformować pacjenta, aby nie przyjmował produktu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. U osób dorosłych o masie ciała większej niż 50 kg, całkowita dawka dobową paracetamolu nie może być większa niż 4 gramy.

Picie napojów alkoholowych lub przyjmowanie środków uspokajających (zwłaszcza barbituranów) nasila działanie uspokajające leków przeciwhistaminowych, dlatego należy unikać jednoczesnego ich przyjmowania. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (G-6-PD) i reduktazy methemoglobinowej. Lek zawiera sacharozę. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Skład

Jedna saszetka zawiera: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg.