



apteka
w sieci

Flegamina Classic Junior syrop o smaku truskawkowym 120 ml



Cena: 10,66 zł

Opis słownikowy

Dawka	4 mg/5 ml
Opakowanie	120ml
Postać	syrop
Producent	TEVA
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Bromhexini hydrochloridum

Opis produktu

Postać leku:

Syrop

Opakowanie:

Butelka 120 ml

Skład:

Chlorowodorek bromoheksyny oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, glukoza, metylu parahydroksybenzoesan, aromat truskawkowy 52311A, koszenila w postaci 7,5% roztworu barwnika, antocyjan w postaci proszku zawierającego 5% barwnika, woda oczyszczona

Działanie:

Rozrzedza gęstą wydzielinę w oskrzelach. Jednocześnie pobudza gruczoły śluzowe do produkcji mniej lepkiego śluzu.

Wskazania:

Choroby oskrzeli z gęstą, nadmiernie lepką wydzieliną, przewlekłe zapalenie oskrzeli, mukowiscydoza, niedodma w wyniku zamknięcia oskrzeli przez śluz, powikłania płucne (choroby płuc) po operacjach i w przebiegu anestezji, po zabiegach diagnostycznych na drzewie oskrzelowym.



Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na bromheksynę lub którykolwiek składnik preparatu.

Ostrzeżenia:

Bromheksyny nie należy stosować u pacjentów z czynną chorobą wrzodową, gdyż lek może nasilać jej objawy. Lek należy stosować ostrożnie u osób z niewydolnością wątroby lub nerek.

Dawkowanie:

Niemowlęta od 6 miesiąca życia do 12 miesiąca życia: pół łyżeczki 2 do 3 razy na dobę. Dzieci: od 1 do 2 lat 1 łyżeczka 2 razy na dobę; od 2 do 5 lat 2 łyżeczki 2 razy na dobę; od 5 do 10 lat 2 łyżeczki 3 razy na dobę; powyżej 10 lat 4 łyżeczki 3 razy na dobę. Należy zażywać w równych odstępach czasu (co 8 lub co 12 godzin), po posiłku.